

## Стрепфен



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)** круглые, из полупрозрачной карамельной массы, от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
флурбипрофен	8.75 мг

*Вспомогательные вещества:* макрогол 300, натрия гидроксид, ароматизатор лимонный 502904А, левоментол, мед, сахароза жидкая, декстроза.

8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

НПВС. Механизм действия флурбипрофена связан с ингибированием фермента ЦОГ-1 и ЦОГ-2 с последующим угнетением синтеза простагландинов – медиаторов боли. Оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Терапевтический эффект препарата развивается через 30 мин после начала рассасывания таблетки в полости рта и продолжается в течение 2-3 ч.

#### Фармакокинетика

##### *Всасывание и распределение*

Быстро абсорбируется из ЖКТ.  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 30-40 мин.

Связывание с белками плазмы - более 99%.

##### *Метаболизм и выведение*

Биотрансформируется в печени путем гидроксилирования.

Выводится с мочой.  $T_{1/2}$  составляет 3-6 ч.

## Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (в качестве симптоматического средства для облегчения боли).

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка (в фазе обострения);
- бронхиальная астма и ринит на фоне приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при гипербилирубинемии (в т.ч. синдроме Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), хронической сердечной недостаточности, отеках, артериальной гипертензии, гемофилии, снижении свертываемости крови, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки (в фазе ремиссии, в анамнезе), почечной и/или печеночной недостаточности, угнетении костномозгового кроветворения, снижении слуха, патологии вестибулярного аппарата, а также у пациентов пожилого возраста.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** рекомендуется принимать по 1 таб. по мере необходимости.

Не следует употреблять более 5 таб. в течение 24 ч.

Не следует принимать препарат более 3 дней.

Таблетки рассасывают в полости рта до полного растворения. При рассасывании следует перемещать таблетку по всей полости рта, во избежание повреждения слизистой оболочки в месте рассасывания.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* искажение вкуса, парестезии (жжение, покалывание, пощипывание), изъязвление слизистой оболочки полости рта.

При приеме препарата внутрь в дозе 50-100 мг 2-3 раза/сут (12-30 таб./сут) могут наблюдаться:

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия (тошнота, рвота, изжога, диарея), гастропатия, абдоминальные боли, нарушение функции печени; при длительном применении в высоких дозах – изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, кровотечение (в т.ч. из десен и геморроидальное).

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* повышение АД, тахикардия, сердечная недостаточность.

*Со стороны системы кроветворения:* редко – анемия (железодефицитная, гемолитическая, апластическая), агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* головная боль, головокружение, сонливость или бессонница, астения, депрессия, амнезия, тремор, возбуждение; редко – атаксия, парестезии, нарушение сознания.

*Со стороны мочевыделительной системы:* тубулоинтерстициальный нефрит, отечный синдром, нарушение функции почек.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, крапивница, бронхоспазм, фотосенсибилизация, отек Квинке, анафилактический шок.

*Прочие:* снижение слуха, шум в ушах, усиление потоотделения.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* при приеме 1 г – сонливость; более 1.5 г – возбуждение; 2.5-4 г – тошнота, головная боль, головокружение, боли в эпигастрии, диплопия, миоз, гипотонус; более 4 г – угнетение сознания вплоть до комы.

*Лечение:* прием препарата следует прекратить; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение Стрепфена при беременности противопоказано. При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При совместном применении с препаратом Стрепфен индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) увеличивают продукцию гидроксiliрованных активных метаболитов флурбипрофена.

При одновременном применении Стрепфен снижает эффективность урикозурических препаратов; усиливает действие антикоагулянтов (повышается риск кровотечений), антиагрегантов, фибринолитиков, побочные эффекты минерало- и глюкокортикоидов, эстрогенов.

При одновременном применении Стрепфен снижает эффективность гипотензивных и мочегонных средств.

При одновременном применении Стрепфен усиливает гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины.

При одновременном применении Стрепфен увеличивает концентрацию в крови препаратов лития, метотрексата.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В случае сочетания болей в горле со значительным повышением температуры тела прием препарата может быть рекомендован только врачом.

При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 ч до исследования.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что таблетка содержит около 2.5 г сахара.

Пациент должен быть предупрежден, что при сохранении высокой температуры, появлении головной боли или других нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют при почечной недостаточности.

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью следует применять препарат при печеночной недостаточности.

### ***Применение в пожилом возрасте***

С осторожностью следует назначать препарат пациентам пожилого возраста.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от влаги, недоступном для детей месте при температуре до 25°C.

## **Стрепфен**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Срок годности - 3 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Strepfen>