

## Стрепсилс



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** красного цвета, круглые, с преобладающим анисовым запахом, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* масло мяты перечной, масло анисовое, левоментол, винная кислота, понсо эдикол, кармазин эдикол, отвердитель из жидкого кондитерского сахара и жидкой декстрозы.

- 4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (лимонные)** желтые, круглые, из полупрозрачной карамельной массы, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* тартаровая кислота, натрия сахаринат, ароматизатор лимонный 74940-74, краситель

хинолиновый желтый (E104), изомальтоза, сироп мальтитола.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)** желтого цвета, круглые, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1,2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* мед, масло мяты перечной, масло лимонное, винная кислота, хинолиновый желтый, отвердитель из жидкого кондитерского сахара и жидкой декстрозы.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

*Активен в отношении* широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

### Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс отсутствуют.

## Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (для облегчения боли при глотании).

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

— детский возраст до 5 лет;  
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 5 лет** рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная

суточная доза - 8 таб.

### **Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

### **Передозировка:**

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

*Симптомы:* дискомфорт со стороны ЖКТ.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможность применения препарата при беременности и в период лактации врач решает индивидуально.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс с лекарственными средствами других групп не выявлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Стрепсилс в форме таблеток для рассасывания (лимонных) можно применять у пациентов с сахарным диабетом, т.к. данная лекарственная форма не содержит сахар.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 таблетке для рассасывания медово-лимонной содержится 2.6 г сахара.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано употреблять детям до 5 лет.

**Взрослым и детям старше 5 лет** рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Strepsils>