

Стрепсилс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** красного цвета, круглые, с преобладающим анисовым запахом, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: масло мяты перечной, масло анисовое, левоментол, винная кислота, понсо эдикол, кармазин эдикол, отвердитель из жидкого кондитерского сахара и жидкой декстрозы.

- 4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (лимонные)** желтые, круглые, из полупрозрачной карамельной массы, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: тартаровая кислота, натрия сахаринат, ароматизатор лимонный 74940-74, краситель

хинолиновый желтый (E104), изомальтоза, сироп мальтитола.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)** желтого цвета, круглые, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1,2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: мед, масло мяты перечной, масло лимонное, винная кислота, хинолиновый желтый, отвердитель из жидкого кондитерского сахара и жидкой декстрозы.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (для облегчения боли при глотании).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 5 лет;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная

суточная доза - 8 таб.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Симптомы: дискомфорт со стороны ЖКТ.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможность применения препарата при беременности и в период лактации врач решает индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Стрепсилс в форме таблеток для рассасывания (лимонных) можно применять у пациентов с сахарным диабетом, т.к. данная лекарственная форма не содержит сахар.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 таблетке для рассасывания медово-лимонной содержится 2.6 г сахара.

Применение в детском возрасте

Противопоказано употреблять детям до 5 лет.

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Strepsils>