

[Стрепсилс Без Сахара](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Состав

Одна таблетка содержит *активные вещества*: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг.

Вспомогательные вещества:

таблетки для рассасывания [лимонные]: винная кислота 26 мг, ароматизатор лимонный 74940-74 4,16 мг, краситель хинолиновый желтый (E104) 0,01 мг, натрия сахаринат 2 мг, изомальтоза 1834,296 мг, сироп мальтитола 458,57 мг до получения таблетки массой 2,35 г.

Описание

Таблетки для рассасывания [лимонные]: Желтые круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания [лимонные].

По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистере (ПВХ/ПВДХ/Алюминий). По 1 или 2 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (облегчает боль и смягчает раздражение в горле).

Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Сахарный диабет](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Местно. Взрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа.

Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Продолжительность курса терапии – 3 дня.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

В состав препарата входят изомальтоза и сироп мальтитола, которые могут оказывать легкое слабительное действие. Не рекомендуется применять препарат пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли, следует обратиться к врачу.

Стрепсилс Без Сахара

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре не выше + 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Таблетки для рассасывания [лимонные]: 3 года.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_Bez_Sahara