Стрепсилс Экспресс



Код АТХ:

- R02AA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амилметакрезол
- Дихлорбензиловый спирт
- Лидокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Спрей для местного применения дозированный*** в виде прозрачного раствора красного цвета, с характерным запахом.

	1 нажатие
2,4-дихлорбензиловый спирт	580 мкг
амилметакрезол	290 мкг
лидокаина гидрохлорид	780 мкг

Вспомогательные вещества: этанол 96%, лимонная кислота, глицерол, сорбитола раствор 70% (некристаллизованный), сахарин, левоментол, масло листьев мяты перечной, масло семян аниса, азорубин (кармазин эдикол), вода очищенная, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота концентрированная.

20 мл (не менее 140 нажатий на клапан (70 доз)) - флаконы стеклянные (1) с дозирующим устройством - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное, местноанестезирующее и противоотечное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro; оказывает противогрибковое действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс Экспресс отсутствуют.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение боли в ротовой полости, глотке, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях (тонзиллит, фарингит, ларингит /в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности/);

— охриплость;

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- Гингивит
- Инфекции
- Ларингит
- Молочница
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют местно.

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется оросить воспаленный участок, дважды нажав на головку флакона (1 доза). При необходимости повторять процедуру каждые 3 ч, не более 6 раз в течение 24 ч.

Продолжительность применения препарата - не более 5 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, потеря чувствительности языка.

Передозировка:

Передозировка препарата Стрепсилс Экспресс маловероятна.

Симптомы: анестезия верхних отделов пищеварительного тракта.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Стрепсилс Экспресс при беременности и в период лактации возможно только под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс Экспресс с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При возможной потере чувствительности языка рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды.

Не следует применять препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_Ekspress