Стрепсилс Экспресс (таблетки)



Код АТХ:

- R02AA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амилметакрезол
- Дихлорбензиловый спирт
- Лидокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки для рассасывания*** голубовато-зеленого цвета, плоскоцилиндрические, с запахом ментола; допускается наличие белого налета, незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	0.6 мг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

Вспомогательные вещества: винная кислота, натрия сахаринат, левоментол, масло листьев мяты перечной, масло семян аниса, краситель хинолиновый желтый, индигокармин, сахароза жидкая, декстроза жидкая (декстроза, олиго- и полисахариды).

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (1) - коробки металлические.
4 шт. - блистеры (2) - коробки металлические.
4 шт. - блистеры (3) - коробки металлические.
6 шт. - блистеры (1) - коробки металлические.
6 шт. - блистеры (2) - коробки металлические.
6 шт. - блистеры (3) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры (1) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры (2) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры (3) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры (1) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры (2) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры (3) - коробки металлические.
4 шт. - блистеры (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
4 шт. - блистеры (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
4 шт. - блистеры (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
6 шт. - блистеры (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
6 шт. - блистеры (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
6 шт. - блистеры (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
4 шт. - блистеры (1) - обложки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - обложки картонные.
4 шт. - блистеры (3) - обложки картонные.
6 шт. - блистеры (1) - обложки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - обложки картонные.
6 шт. - блистеры (3) - обложки картонные.
8 шт. - блистеры (1) - обложки картонные.
8 шт. - блистеры (2) - обложки картонные.
8 шт. - блистеры (3) - обложки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - обложки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - обложки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - обложки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное, местноанестезирующее и противоотечное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro; оказывает противогрибковое действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс Экспресс отсутствуют.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение боли в ротовой полости, глотке, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях (тонзиллит, фарингит, ларингит /в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности/);

— охриплость;

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- Гингивит
- Инфекции
- Ларингит
- Молочница
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют местно.

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуют рассасывать по 1 таб. каждые 2-3ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Продолжительность применения – не более 5 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, потеря чувствительности языка.

Передозировка:

Передозировка препарата маловероятна.

Симптомы: анестезия верхних отделов пищеварительного тракта.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При возможной потере чувствительности языка рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды.

Не следует применять препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка содержит 2.6 г

сахара.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_Ekspress_tabletki