

## [Стрепсилс Плюс](#)



### Код АТХ:

- [R02AA20](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)
- [Лидокаин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** светлого голубовато-зеленого цвета, плоскоцилиндрические, с запахом ментола; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорид	10 мг

*Вспомогательные вещества:* тартаровая кислота, натрия сахаринат, левоментол, масло мяты перечной, масло анисовое, хинолиновый желтый, индигокармин, сахароза жидкая, декстроза жидкая.

- 4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ <b>Спрей для местного применения дозированный</b>	<b>1 доза</b>
---	---------------

## Стрепсилс Плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

2,4-дихлорбензиловый спирт	580 мкг
амилметакрезол	290 мкг
лидокаина гидрохлорид	780 мкг

*Вспомогательные вещества:* этанол 96%, лимонная кислота, натрия гидроксид, сахарин, глицерол, сорбитол 70%, левоментол, масло мяты перечной, масло анисовое, кармазин эдикол, вода очищенная, хлористоводородная кислота.

20 мл (70 доз) - флаконы с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат с местноанестезирующим действием для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

#### Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс Плюс отсутствуют.

### Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом.

### Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Инфекции](#)

### Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таблетке для рассасывания каждые 2 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Таблетки следует рассасывать во рту до полного растворения.

Препарат в форме спрея назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 1 дозе (2 нажатия на распылитель) для орошения воспаленного участка; при необходимости процедуру повторяют каждые 3 ч, но не более 6 доз в сутки. Продолжительность применения - не более 5 дней.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции; при применении препарата в форме спрея - потеря чувствительности языка, в отдельных случаях - развитие системных побочных эффектов лидокаина.

### Передозировка:

## **Стрепсилс Плюс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В связи с низкой системной абсорбцией активных веществ передозировка препарата Стрепсилс Плюс маловероятна.

*Симптомы:* выраженная анестезия верхних отделов пищеварительного тракта.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата Стрепсилс Плюс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно по показаниям и только под контролем врача.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс Плюс с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При возникновении после применения спрея анестезии языка следует проявлять осторожность при приеме горячей пищи и воды.

При назначении препарата в форме таблеток для рассасывания пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что каждая таблетка содержит 2.6 г сахара.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат в форме таблеток для рассасывания следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, в форме спрея - не выше 30°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Strepsils\\_Plyus](http://drugs.thead.ru/Strepsils_Plyus)