

[Стрепсилс Плюс](#)



Код АТХ:

- [R02AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)
- [Лидокаин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Таблетки для рассасывания** светлого голубовато-зеленого цвета, плоскоцилиндрические, с запахом ментола; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: тартаровая кислота, натрия сахаринат, левоментол, масло мяты перечной, масло анисовое, хинолиновый желтый, индигокармин, сахароза жидкая, декстроза жидкая.

- 4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◊ Спрей для местного применения дозированный	1 доза
---	---------------

Стрепсилс Плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

2,4-дихлорбензиловый спирт	580 мкг
амилметакрезол	290 мкг
лидокаина гидрохлорид	780 мкг

Вспомогательные вещества: этанол 96%, лимонная кислота, натрия гидроксид, сахарин, глицерол, сорбитол 70%, левоментол, масло мяты перечной, масло анисовое, кармазин эдикол, вода очищенная, хлористоводородная кислота.

20 мл (70 доз) - флаконы с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат с местноанестезирующим действием для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс Плюс отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом.

Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке для рассасывания каждые 2 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Таблетки следует рассасывать во рту до полного растворения.

Препарат в форме спрея назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 1 дозе (2 нажатия на распылитель) для орошения воспаленного участка; при необходимости процедуру повторяют каждые 3 ч, но не более 6 доз в сутки. Продолжительность применения - не более 5 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции; при применении препарата в форме спрея - потеря чувствительности языка, в отдельных случаях - развитие системных побочных эффектов лидокаина.

Передозировка:

Стрепсилс Плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В связи с низкой системной абсорбцией активных веществ передозировка препарата Стрепсилс Плюс маловероятна.

Симптомы: выраженная анестезия верхних отделов пищеварительного тракта.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Стрепсилс Плюс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно по показаниям и только под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс Плюс с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении после применения спрея анестезии языка следует проявлять осторожность при приеме горячей пищи и воды.

При назначении препарата в форме таблеток для рассасывания пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что каждая таблетка содержит 2.6 г сахара.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток для рассасывания следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, в форме спрея - не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_Plyus