Стрепсилс С Витамином С

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** оранжевого цвета, круглые, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	100 мг

Вспомогательные вещества: ароматизатор красно-оранжевый 78300-34, левоментол, пропиленгликоль, краситель закатно-желтый, понсо 4R эдикол, тартаровая кислота, сахароза жидкая, декстроза жидкая.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro; оказывает противогрибковое действие.

Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Стрепсилс с витамином С отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (для облегчения боли при глотании).

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— детский возраст до 5 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Симптомы: дискомфорт со стороны ЖКТ.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможность применения препарата при беременности и в период лактации врач решает индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс с витамином С с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 таблетке Стрепсилс с витамином С содержится 2.6 г сахара.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_S_Vitaminom_S