Стрепсилс с Согревающим Эффектом



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амилметакрезол
- Дихлорбензиловый спирт
- Левоментол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания***	**1 таб.**
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
10 шт. - тубы полипропиленовые - ламинированной упаковочной.

◊ ***Таблетки для рассасывания***	**1 таб.**
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

амилметакрезол	600 мкг

8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
10 шт. - тубы полипропиленовые - ламинированной упаковочной.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro, оказывает антимикотическое действие.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в том числе профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности);

— охриплости;

— воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- Воспаление
- Гингивит
- Инфекции
- Ларингит
- Молочница
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст (до 6 лет).

С осторожностью: беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма.

Способ применения и дозы:

Местно. Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет. Рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 ч. **Взрослым и детям старше 12 лет** не принимать более 12 таблеток в течение 24 ч. **Детям от 6 до 12 лет** не принимать более 8 таблеток в течение 24 ч. Не превышать указанную дозу.

Курс лечения 3 дня. При сохранении симптомов в течение более 3-х дней необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Аллергические реакции: сыпь, чувство жжения и покалывания в горле, возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

Симптомы: возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны ЖКТ - тошноте.

Лечение: симптоматическое под контролем врача.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не зарегистрировано. Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая таблетка содержит около 2.6 г сахара, что соответствует 0.22 ХЕ (хлебные единицы).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей старше 6 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей, в сухом месте при температуре не выше 25°С.

Не использовать после истечения срока годности. Туба: использовать в течение 3 месяцев после вскрытия.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_s_Sogrevayushchim_Effektom