

Стрепсилс с Согревающим Эффектом



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)
- [Левоментол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Таблетки для рассасывания	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1,2 мг
амилметакрезол	600 мкг
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.	
10 шт. - тубы полипропиленовые - ламинированной упаковочной.	
♦ Таблетки для рассасывания	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1,2 мг

амилметакрезол	600 мкг
----------------	---------

8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - коробки металлические.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - коробки металлические.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
8 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (3) - пакеты из фольги ламинированной упаковочной.
10 шт. - тубы полипропиленовые - ламинированной упаковочной.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, оказывает антимикотическое действие.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в том числе профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности);

— охриплости;

— воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Ларингит](#)
- [Молочница](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст (до 6 лет).

С осторожностью: беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма.

Способ применения и дозы:

Местно. Рекомендуются взрослым и детям старше 6 лет. Рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 ч. **Взрослым и детям старше 12 лет** не принимать более 12 таблеток в течение 24 ч. **Детям от 6 до 12 лет** не принимать более 8 таблеток в течение 24 ч. Не превышать указанную дозу.

Курс лечения 3 дня. При сохранении симптомов в течение более 3-х дней необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Аллергические реакции: сыпь, чувство жжения и покалывания в горле, возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

Симптомы: возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны ЖКТ - тошноте.

Лечение: симптоматическое под контролем врача.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не зарегистрировано. Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая таблетка содержит около 2.6 г сахара, что соответствует 0.22 ХЕ (хлебные единицы).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей старше 6 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей, в сухом месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать после истечения срока годности. Туба: использовать в течение 3 месяцев после вскрытия.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_s_Sogrevayushchim_Effektom