

Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)
- [Левоментол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** голубого цвета, круглые, с изображением буквы "S" с двух сторон таблетки; допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
левоментол	8 мг

Вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, винная кислота, индигокармин, отвердитель из жидкого кондитерского сахара и жидкой декстрозы.

- 4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 4 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (для облегчения боли при глотании).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Симптомы: дискомфорт со стороны ЖКТ.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Стрепсилса с ментолом и эвкалиптом при беременности и в период лактации возможно по показаниям под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Клинически значимого взаимодействия препарата Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таб. содержит 2.6 г сахара.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Strepsils_s_mentolom_i_evkaliptom