

## Стрептоцид (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

## [Стрептоцид \(порошок\)](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Антибактериальное средство широкого спектра действия. Сульфаниламид (стрептоцид) - один из первых представителей химиотерапевтических средств группы сульфаниламидов. Оказывает бактериостатическое действие. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением фермента дигидроптероатсинтетазы. Это приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате - к нарушению синтеза нуклеиновых кислот.

Сульфаниламид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium* spp., *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, а также в отношении *Chlamydia* spp., *Actinomyces* spp., *Toxoplasma gondii*.

### Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к сульфаниламиду микроорганизмами, в т.ч. ангины, рожистые воспаления, циститы, пиелиты, энтероколиты, инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек.

### Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Воспаление](#)
- [Инфекции](#)
- [Пиелит](#)
- [Цистит](#)
- [Энтерит](#)

### Противопоказания:

Тяжелая почечная недостаточность, заболевания крови, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, нефрозы, нефриты, острая порфирия, тиреотоксикоз, I и II триместры беременности, лактация, повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

## Стрептоцид (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым - 500 мг-1 г 5-6 раз/сут; детям до 1 года - 50-100 мг, от 2 до 5 лет - 200-300 мг, от 6 до 12 лет - 300-500 мг на прием.

*Максимальные дозы* для взрослых при приеме внутрь: разовая 2 г, суточная - 7 г.

При наружном применении наносят на пораженные участки кожи и слизистых оболочек.

### Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея.

*Со стороны системы кроветворения:* редко - эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, гипопротромбинемия, агранулоцитоз.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* в единичных случаях - нарушение зрения, головная боль, головокружение, периферическая невропатия, атаксия.

*Прочие:* кожные аллергические реакции; редко - нефротоксические реакции (наиболее вероятны у пациентов с нарушениями функции почек); В единичных случаях - гипотиреозидизм.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению в I и II триместрах беременности и в период лактации.

### Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять у пациентов с нарушениями функции почек. В период лечения необходимо увеличить объем потребляемой жидкости.

При появлении реакций повышенной чувствительности лечение следует прекратить.

При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции почек и печени.

#### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, нефрозах, нефритах. С осторожностью применять у пациентов с нарушениями функции почек. В период лечения необходимо увеличить объем потребляемой жидкости.

#### **Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Streptocid\\_poroshok](http://drugs.thead.ru/Streptocid_poroshok)