

Стрептолавен



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения белого цвета или белого цвета с легким желтоватым оттенком; допускается наличие частиц коричневого цвета со слабым специфическим запахом.

	100 г
мирамистин (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорид)	500 мг
ультрализин (коллагенолитический фермент из культуральной жидкости <i>Streptomyces Lavendulae</i>)	3.9 мл

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 400 до 100 г, проксанол-268 24 г.

500 г - банки полимерные.

1 кг - банки полимерные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Основное действующее вещество мази - ультрализин (коллагенолитический фермент, получаемый из культуральной жидкости *Streptomyces Lavendulae*). Входящий в состав мази антисептик мирамистин обеспечивает её бактерицидную активность в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе антибиотикерезистентных. Водорастворимая основа мази за счет осмотической активности эффективно удаляет раневой экссудат, способствует лучшему проникновению мирамистина и ультрализина в рану.

Показания к применению:

— раны с обильным гнойным отделяемым (1 фаза раневого процесса) при острых гнойных заболеваниях мягких тканей (панариции, абсцессы, флегмоны, парапроктиты и т. п.), диабетической, атеросклеротической гангрене;

— для удаления некротических тканей с поверхности послеоперационных, посттравматических ран, трофических язв, термических поражений, осложненных развитием гнойных процессов.

Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)

- [Атеросклероз](#)
- [Раны](#)
- [Флегмона](#)

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость компонентов мази.

Способ применения и дозы:

Наружно. При лечении ран с обильным гнойным отделяемым мазь Стрептолавен применяют после удаления свободно лежащих некротических тканей, тщательной ликвидации всех слепых гнойных затеков и обработки 3% раствором перекиси водорода. На оставшиеся некротические ткани накладывают тонкий слой мази, а всю полость раны заполняют марлевыми салфетками, пропитанными мазью "Стрептолавен". Смену тампонов проводят один раз в сутки до прекращения воспалительного процесса, полного освобождения раневой поверхности от некротических тканей, появления в ране грануляций и краевой эпителизации.

Рекомендуемый расход мази на 1 перевязку не должен превышать 200 г.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - чувство жжения в месте применения (проходит самостоятельно в течение 10-15 сек и не требует отмены препарата), аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Стрептолавен не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно назначение препарата Стрептолавен в периоды беременности и лактации по показаниям, т.к. при наружном и местном применении системная абсорбция активного вещества маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описаны.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, недоступном для детей при температуре от 8°C до 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Streptolaven>