

## Стрезам



### Код АТХ:

- [N05BX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Этифоксин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы** желатиновые, гладкие, блестящие, №2, с белым корпусом и голубой крышечкой; содержимое капсул - порошок белого или белого с легким желтоватым оттенком цвета.

	<b>1 капс.</b>
этифоксина гидрохлорид	50 мг

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, тальк, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

*Состав оболочки:* титана диоксид, желатин, индигокармин.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Анксиолитик (транквилизатор). Производное бензоксазина, обладает анксиолитической активностью, в меньшей степени оказывает седативное действие. Избирательно воздействует на хлорные каналы супрамолекулярного GABA-бензодиазепин-хлор-ионофор рецепторного комплекса, ингибируя GABA-ергическую передачу.

Не вызывает привыкания и синдрома отмены.

**Фармакокинетика***Всасывание*

После приема внутрь препарат быстро всасывается из ЖКТ. Время достижения  $C_{max}$  в крови составляет 2-3 ч.

*Распределение*

Проникает через плацентарный барьер.

*Метаболизм*

Быстро метаболизируется в печени до образования нескольких метаболитов. Один из метаболитов - диэтилэтифоксин - является активным.

*Выведение*

$T_{1/2}$  этифоксина составляет около 6 ч,  $T_{1/2}$  активного метаболита - 20 ч. Выводится преимущественно с мочой в виде метаболитов и в небольших количествах в неизменном виде; также выводится с желчью.

**Показания к применению:**

— для устранения тревоги, страха, внутреннего напряжения, повышенной раздражительности, снижения настроения (в т.ч. на фоне соматических заболеваний, особенно сердечноvascularной природы).

**Относится к болезням:**

- [Кардит](#)

**Противопоказания:**

- шоковые состояния;
- миастения;
- тяжелые нарушения функции печени;
- тяжелые нарушения функции почек;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Дозу и продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Препарат назначают внутрь, как правило, по 50 мг (1 капс.) 3 раза/сут или по 100 мг (2 капс.) 2 раза/сут. Курс лечения обычно составляет от нескольких дней до 4-6 недель.

Капсулы запивают небольшим количеством воды.

**Побочное действие:**

Со стороны ЦНС: незначительная сонливость, появляющаяся в первые дни приема и обычно исчезающая самостоятельно в процессе лечения.

*Аллергические реакции:* редко - кожные высыпания, крапивница, отек Квинке.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* вялость, чрезмерная сонливость.

*Лечение:* промывание желудка большим количеством воды, симптоматическое лечение. Специфический антидот отсутствует.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.

При беременности, наступившей во время лечения препаратом Стрезам, пациентка должна проконсультироваться с врачом по поводу продолжения лечения.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Стрезам потенцирует действие препаратов, угнетающих ЦНС (в т.ч. опиоидных анальгетиков, барбитуратов, снотворных препаратов, антигистаминных средств, нейролептиков).

Стрезам усиливает воздействие этанола.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В составе препарата Стрезам присутствует лактоза, что следует учитывать при назначении препарата пациентам с галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, а также в случае лактазной недостаточности.

В случае пропуска приема препарата не следует удваивать дозу при следующем приеме.

Предписанную врачом дозу превышать не следует.

Не рекомендуется принимать препарат при употреблении алкогольных напитков.

### *Использование в педиатрии*

Не рекомендуется использовать препарат у **детей и подростков в возрасте до 18 лет.**

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В связи с риском возникновения сонливости следует избегать управления автотранспортом и деятельности, требующей повышенного внимания, например, управления различными механизмами.

### **При нарушениях функции почек**

Применение препарата при тяжелых нарушениях функции почек противопоказано.

### **При нарушениях функции печени**

Применение препарата при тяжелых нарушениях функции печени противопоказано.

### **Применение в детском возрасте**

Не рекомендуется использовать препарат у **детей и подростков в возрасте до 18 лет.**

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

**Стрезам**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Strezam>