Стрикс



Код АТХ:

- V06DX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** темно-фиолетового цвета, с фиолетовыми вкраплениями различной интенсивности окраски, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
сухой экстракт плодов черники	82.4 мг
бетакаротен (в форме 10% концентрата)	1.2 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кремния диоксид, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, лиофилизат сока плодов черники.

Состав оболочки: метилцеллюлоза.

30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения.

Стимулирует синтез и регенерацию зрительного пигмента родопсина, способствуя повышению остроты зрения, улучшает адаптацию к темноте и условиям пониженной освещенности. Обладает апгиопротективным действием и улучшает кровоснабжение сетчатки глаза. Препарат обладает антиоксидантным действием.

Показания к применению:

— проявления синдрома зрительного утомления при длительной работе с компьютером и чтении;

— близорукость различной степени;

— нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия);

— диабетическая ретинопатия;

— центральная и периферическая дистрофия сетчатки;

— в комплексной терапии первичной глаукомы;

— в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.

Относится к болезням:

- Глаукома
- Ретинопатия

Противопоказания:

— детский возраст до 7 лет (в связи с отсутствием клинических данных);

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Детям с 7 лет назначают по 1 таб./сут, **взрослым -** по 2 таб./сут. Курс лечения - 1 месяц.

Таблетку запивать необходимым количеством воды. Повторные курсы проводят по рекомендации врача.

Побочное действие:

При индивидуальной непереносимости к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 7 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Striks