

Стрикс



Код АТХ:

- [V06DX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** темно-фиолетового цвета, с фиолетовыми вкраплениями различной интенсивности окраски, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
сухой экстракт плодов черники	82.4 мг
бетакаротен (в форме 10% концентрата)	1.2 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кремния диоксид, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, лиофилизат сока плодов черники.

Состав оболочки: метилцеллюлоза.

30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения.

Стимулирует синтез и регенерацию зрительного пигмента родопсина, способствуя повышению остроты зрения, улучшает адаптацию к темноте и условиям пониженной освещенности. Обладает алгиопротективным действием и улучшает кровоснабжение сетчатки глаза. Препарат обладает антиоксидантным действием.

Показания к применению:

- проявления синдрома зрительного утомления при длительной работе с компьютером и чтении;
- близорукость различной степени;

- нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия);
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дистрофия сетчатки;
- в комплексной терапии первичной глаукомы;
- в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.

Относится к болезням:

- [Глаукома](#)
- [Ретинопатия](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 7 лет (в связи с отсутствием клинических данных);
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Детям с 7 лет назначают по 1 таб./сут, **взрослым** - по 2 таб./сут. Курс лечения - 1 месяц.

Таблетку запивать необходимым количеством воды. Повторные курсы проводят по рекомендации врача.

Побочное действие:

При индивидуальной непереносимости к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 7 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Стрикс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Striks>