Структум



Код АТХ:

- M01AX25

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хондроитина сульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы 250 мг в блистере 15 шт.; в картонной коробке 4 блистера.

Капсулы 500 мг в блистере 12 шт.; в картонной коробке 5 блистеров.

Состав:

Одна капсула содержит

Активное вещество: хондроитина сульфат натрия 250 мг/500 мг

Вспомогательное вещество: тальк 5 мг/10 мг

Состав оболочки капсулы (корпуса и крышечки): индиго кармин, титана диоксид, желатин.

Описание:

Желатиновые капсулы голубого цвета. Размер капсул: №1 — для 250 мг; №0 — для 500 мг.

Содержимое капсул: порошок беловато-кремового цвета, допускается наличие конгломератов (комочков), связанных с особенностями пространственной структуры.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Влияет на обменные процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах, уменьшает дегенеративные изменения в хрящевой ткани суставов, стимулирует биосинтез гликозаминогликанов. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. Уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов. Терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

Фармакокинетика

Более 70% хондроитина сульфата всасывается в пищеварительном тракте. При однократном приеме внутрь C_{max} в плазме достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости (где препарат накапливается) — через 4–5 ч. Биодоступность — 13%. Выводится почками.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояних:

— остеоартрозы;

— межпозвонковый остеохондроз.

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеохондроз

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 15 лет (ввиду отсутствия точных данных).

Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая водой.

Взрослым и подросткам с 15 лет — 1 г/сут: по 2 капс. (250 мг) или по 1 капс. (500 мг) 2 раза в сутки.

Рекомендуемая продолжительность начального курса — 6 мес, период действия препарата после его отмены — 3–5 мес в зависимости от локализации и стадии заболевания, продолжительность повторных курсов устанавливается врачом.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Аллергические реакции: редко — крапивница, эритема, кожный зуд.

Передозировка:

Симптомы: редко - тошнота, рвота, диарея, при длительном приеме в чрезмерно высоких дозах (более 3 г/сут) возможны геморрагические высыпания.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

До сих пор в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных. В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия на плод.

Однако во время беременности и грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата ввиду отсутствия достаточного количества клинических данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратом Структум возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать пациентам с кровотечениями, а также — со склонностью к кровотечениям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Struktum