# Сульфацил Натрия--Солофарм



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

◊ ***Капли глазные 20%*** в виде прозрачной, бесцвтной или слегка окрашенной жидкости.

| | **1 мл** |
|---|---|
| сульфацетамид натрия моногидрат (в пересчете на сульфацетамид натрия) | 200 мг |

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфата пентагидрат - 1 мг, хлористоводородная кислота 1М раствор - до pH 8.0, вода д/и - до 1 мл.

0.5 мл - тюбик-капельницы (3) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.
0.5 мл - тюбик-капельницы (5) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.
1 мл - тюбик-капельницы (3) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.
1 мл - тюбик-капельницы (5) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.
5 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Антибактериальное средство для местного применения в офтальмологии, производное сульфаниламида. Обладает широким спектром противомикробного действия. Оказывает бактериостатическое действие. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Сульфацетамид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. патогенных кокков, Escherichia coli), Chlamydia spp., Actinomyces spp.

***Фармакокинетика***

При местном применении проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

## Показания к применению:

Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, гонорейные заболевания глаз у новорожденных и взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

## Относится к болезням:

- Блефарит
- Гонорея
- Конъюнктивит

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к сульфацетамиду и другим сульфаниламидным препаратам.

## Способ применения и дозы:

Применяют по 2-3 капли в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 5-6 раз/сут.

Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают в глаза по 2 капли раствора непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 ч.

## Побочное действие:

Диагнозы

- Астигматизм
- Атрофия зрительного нерва
- Глаукома
- Дальнозоркость

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сульфацетамид при местном применении несовместим с солями серебра.

## Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы, могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Sulfacil_Natriya--Solofarm