

## Сульфацил Натрия--Солофарм



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Капли глазные 20%** в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

сульфацетамид натрия моногидрат (в пересчете на сульфацетамид натрия)	<b>1 мл</b> 200 мг
---	-----------------------

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфата пентагидрат - 1 мг, хлористоводородная кислота 1М раствор - до pH 8.0, вода д/и - до 1 мл.

0.5 мл - тубик-капельницы (3) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.

0.5 мл - тубик-капельницы (5) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.

1 мл - тубик-капельницы (3) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.

1 мл - тубик-капельницы (5) - пакеты ламинированные (1) - пачки картонные.

5 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибактериальное средство для местного применения в офтальмологии, производное сульфаниламида. Обладает широким спектром противомикробного действия. Оказывает бактериостатическое действие. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Сульфацетамид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. патогенных кокков, *Escherichia coli*), *Chlamydia* spp., *Actinomyces* spp.

#### **Фармакокинетика**

При местном применении проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

### **Показания к применению:**

Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, гонорейные заболевания глаз у новорожденных и взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

## Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Гонорея](#)
- [Конъюнктивит](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к сульфациламиду и другим сульфаниламидным препаратам.

## Способ применения и дозы:

Применяют по 2-3 капли в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 5-6 раз/сут.

Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают в глаза по 2 капли раствора непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 ч.

## Побочное действие:

Диагнозы

- Астигматизм
- Атрофия зрительного нерва
- Глаукома
- Дальнозоркость

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сульфацилаид при местном применении несовместим с солями серебра.

## Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы, могут иметь повышенную чувствительность к сульфациламиду.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Sulfacil\\_Natriya--Solofarm](http://drugs.thead.ru/Sulfacil_Natriya--Solofarm)