

Сульфацил натрия (Альбуцид)



Код АТХ:

- [S01AB04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сульфацетамид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капли глазные 20%** в виде прозрачной, бесцветной или со слегка желтоватым оттенком жидкости.

	1 мл
сульфацетамид натрия моногидрат	200 мг

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфата пентагидрат - 1.5 мг, хлористоводородная кислота 1М - до pH 7.5-8.5, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальное средство для местного применения в офтальмологии, производное сульфаниламида. Обладает широким спектром противомикробного действия. Оказывает бактериостатическое действие. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Сульфацетамид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. патогенных кокков, *Escherichia coli*), *Chlamydia* spp., *Actinomyces* spp.

Фармакокинетика

Сульфацил натрия (Альбуцид)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При местном применении проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

Показания к применению:

Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, гонорейные заболевания глаз у новорожденных и взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Гонорея](#)
- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к сульфациламиду и другим сульфаниламидным препаратам.

Способ применения и дозы:

Применяют по 2-3 капли в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 5-6 раз/сут.

Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают в глаза по 2 капли раствора непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 ч.

Побочное действие:

Диагнозы

- Астигматизм
- Атрофия зрительного нерва
- Глаукома
- Дальнозоркость

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сульфациламид при местном применении несовместим с солями серебра.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы, могут иметь повышенную чувствительность к сульфациламиду.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sulfacil_natriya_Albugid