

## Сульфасалазин-ЕН



### Код АТХ:

- [A07EC01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сульфасалазин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** от желтого до коричневатого-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенным краем, с характерным запахом; на изломе - от оранжевого до коричневатого-оранжевого цвета.

	<b>1 таб.</b>
сульфасалазин	500 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон, крахмал прежелатинизированный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный.

*Состав оболочки:* титана диоксид, краситель железа оксид желтый 10 (E172), тальк, триэтилцитрат, макрогол-6000, кармеллоза натрия, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1).

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

**Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** от желтого до коричневатого-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенным краем, с характерным запахом; на изломе - от оранжевого до коричневатого-оранжевого цвета.

	<b>1 таб.</b>
сульфасалазин	500 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон, крахмал прежелатинизированный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный.

*Состав оболочки:* титана диоксид, краситель железа оксид желтый 10 (E172), тальк, триэтилцитрат, макрогол-6000, кармеллоза натрия, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1).

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

**Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** от желтого до коричневатого-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенным краем, с характерным запахом; на изломе - от оранжевого до коричневатого-оранжевого цвета.

	<b>1 таб.</b>
сульфасалазин	500 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон, крахмал прежелатинизированный, магния стеарат, кремния диоксид

коллоидный безводный.

*Состав оболочки:* титана диоксид, краситель железа оксид желтый 10 (E172), тальк, триэтилцитрат, макрогол-6000, кармеллоза натрия, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1).

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат для лечения болезни Крона и НЯК. Сульфасалазин избирательно накапливается в соединительной ткани кишечника с высвобождением 5-аминосалициловой кислоты, обладающей противовоспалительной активностью, и сульфапиридина, оказывающего противомикробное действие в отношении диплококков, стрептококков, гонококков, кишечной палочки.

### Фармакокинетика

#### Всасывание

Сульфасалазин плохо абсорбируется в кишечнике (не более 10%). Подвергается расщеплению микрофлорой кишечника с образованием 60-80% сульфапиридина и 25% 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК).

#### Распределение

Связывание с белками плазмы составляет для сульфасалазина - 99%, для сульфапиридина - 50%, для 5-АСК - 43%.

#### Метаболизм

В печени сульфапиридин биотрансформируется в основном путем гидроксилирования с образованием неактивных метаболитов, 5-АСК - путем ацетилирования.

#### Выведение

$T_{1/2}$  сульфасалазина составляет 5-10 ч, сульфапиридина - 6-14 ч, 5-АСК - 0.6-1.4 ч. С калом выводится 5% сульфапиридина и 67% 5-АСК; 75-91% всосавшегося сульфасалазина выводится почками в течение 3 дней.

## Показания к применению:

- неспецифический язвенный колит (лечение обострений и поддерживающая терапия в фазе ремиссии);
- болезнь Крона (легкие и среднетяжелые формы в фазе обострения);
- ревматоидный артрит;
- ювенильный ревматоидный артрит.

## Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Колит](#)
- [Ревматоидный артрит](#)

## Противопоказания:

- порфирия;
- анемия;
- выраженные нарушения функции печени;

- выраженные нарушения функции почек;
- дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- детский возраст до 5 лет;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к сульфаниламидам и производным салициловой кислоты.

## Способ применения и дозы:

При *НЯК и болезни Крона* **взрослым** в первый день лечения назначают по 500 мг 4 раза/сут; во 2-й день - по 1 г 4 раза/сут; в 3-й и последующие дни - по 1.5-2 г 4 раза/сут. После стихания острых клинических симптомов заболевания назначают препарат в поддерживающей дозе по 500 мг 3-4 раза/сут в течение нескольких месяцев.

**Детям в возрасте 5-7 лет** назначают по 250-500 мг 3-6 раз/сут, **детям старше 7 лет** - по 500 мг 3-6 раз/сут.

При *ревматоидном артрите* **взрослым** в течение первой недели препарат назначают по 500 мг 1 раз/сут; в течение 2 недели - по 500 мг 2 раза/сут; в течение 3 недели - по 500 мг 3 раза/сут. Терапевтическая суточная доза Сульфасалазина-ЕН может составлять от 1.5 до 3 г. Курс лечения - 6 мес и более.

**Детям в возрасте старше 6 лет** препарат назначают в дозе 30-50 мг/кг массы тела/сут, разделенной на 2-4 приема; для **детей старше 16 лет** максимальная суточная доза составляет 2 г.

Препарат следует принимать после еды.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* головная боль, головокружение, шум в ушах, атаксия, судороги, нарушения сна, галлюцинации, периферическая невропатия.

*Со стороны мочевыделительной системы:* нарушения функции почек, интерстициальный нефрит.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея, боль в животе, анорексия, гепатит, панкреатит.

*Со стороны дыхательной системы:* интерстициальный пневмонит и другие поражения легочной ткани.

*Со стороны системы кроветворения:* анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

*Со стороны репродуктивной системы:* преходящие олигоспермия, бесплодие.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), лихорадка, анафилактический шок.

*Прочие:* возможно окрашивание в желтый цвет кожи, мочи, мягких контактных линз.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, боли в животе, головокружение.

*Лечение:* промывание желудка, форсированный диурез; симптоматическая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Сульфасалазина-ЕН при беременности возможно только по строгим показаниям в минимальной эффективной дозе. Если позволяет течение заболевания, рекомендуется отменить препарат в III триместре беременности.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении Сульфасалазин-ЕН уменьшает абсорбцию фолиевой кислоты и дигоксина.

При одновременном применении Сульфасалазин-ЕН усиливает действие антикоагулянтов, противоэпилептических и пероральных гипогликемических препаратов.

При одновременном применении Сульфасалазин-ЕН усиливает побочное действие цитостатиков, иммунодепрессантов, гепато- и нефротоксичных средств.

При одновременном применении Сульфасалазина-ЕН и антибиотиков возможно снижение эффективности Сульфасалазина-ЕН при язвенном колите, поскольку антибиотики оказывают угнетающее действие на кишечную флору.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени и/или почек, пациентам с бронхиальной астмой, аллергическими реакциями.

В период применения препарата рекомендуется употребление повышенного количества жидкости.

В период применения препарата следует контролировать уровень печеночных ферментов, общий анализ крови и мочи.

### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с нарушениями функции почек.

При тяжелых нарушениях функции почек применение препарата противопоказано.

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени.

При тяжелых нарушениях функции печени применение препарата противопоказано.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sulfasalazin-EN>