

## [Сульфодекортэм](#)



### **Код АТХ:**

- [D07BA04](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Гормоны и их антагонисты](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат. За счет содержания гидрокортизона и серы осажденной оказывает кератолитическое, противопаразитарное, противовоспалительное, противоаллергическое действие.

### **Показания к применению:**

- себорея;
- розацеа, розовые угри;
- псориаз волосистой части головы (прогрессирующая и стационарная стадии);
- чесотка, осложненная дерматитом.

### **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)
- [Псориаз](#)
- [Розацеа](#)
- [Розовые угри](#)
- [Себорея](#)
- [Угри](#)

### **Противопоказания:**

- беременность;

- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Местно, мазь наносят тонким слоем, слегка втирая в пораженный участок кожи 2 раза/сут в течение 5-14 дней. В случае необходимости через 5-7 дней курс лечения повторяют.

При *псориазе волосистой части головы* препарат наносят после мытья головы с мылом.

При *розовых угрях* мазь применяют после обработки кожи антисептическим раствором.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* эритема и зуд (требуют отмены препарата).

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sulfodekortem>