Сульфокаин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры. Оказывает прямое действие на миокард, усиливая обменные процессы и повышая его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает вентиляцию легких, легочный кровоток. Увеличивает секрецию бронхиальных желез.

Показания к применению:

— острая сердечно-легочная недостаточность;

— кардиогенный шок;

— анафилактический шок.

Относится к болезням:

- Кардит
- Шок

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью:* артериальная гипотензия, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

П/к, в/м, в/в (струйно или капельно), 2 мл 10% раствора, 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 12 мл 10% раствора.

Побочное действие:

Снижение АД (особенно у пациентов с исходно сниженным АД), аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью:* беременность, период лактации

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с сердечными гликозидами, стероидными гормонами и анальгетиками.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sulfokain