

Сульфокамфокаин



Код АТХ:

- [R07AB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Прокаин](#)
- [Сульфокамфорная кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры. Оказывает прямое действие на миокард, усиливая обменные процессы и повышая его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает вентиляцию легких, легочный кровоток. Увеличивает секрецию бронхиальных желез.

Показания к применению:

- острая сердечно-легочная недостаточность;
- кардиогенный шок;
- анафилактический шок.

Относится к болезням:

- [Кардит](#)
- [Шок](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью*: артериальная гипотензия, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

П/к, в/м, в/в (струйно или капельно), 2 мл 10% раствора, 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 12 мл 10% раствора.

Побочное действие:

Снижение АД (особенно у пациентов с исходно сниженным АД), аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью*: беременность, период лактации

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с сердечными гликозидами, стероидными гормонами и анальгетиками.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sulfokamfokain>