

## Сульфокамфокаин



### **Код АТХ:**

- [R07AB](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Прокаин](#)
- [Сульфокамфорная кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры. Оказывает прямое действие на миокард, усиливая обменные процессы и повышая его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает вентиляцию легких, легочный кровоток. Увеличивает секрецию бронхиальных желез.

### **Показания к применению:**

- острая сердечно-легочная недостаточность;
- кардиогенный шок;
- анафилактический шок.

## Относится к болезням:

- [Кардит](#)
- [Шок](#)

## Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью*: артериальная гипотензия, беременность, период лактации.

## Способ применения и дозы:

П/к, в/м, в/в (струйно или капельно), 2 мл 10% раствора, 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 12 мл 10% раствора.

## Побочное действие:

Снижение АД (особенно у пациентов с исходно сниженным АД), аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью*: беременность, период лактации

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с сердечными гликозидами, стероидными гормонами и анальгетиками.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sulfokamfokain>