

## Супиоцин



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Мупироцин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибиотик широкого спектра действия. Активен в отношении грамположительных бактерий, вызывающих развитие кожных инфекций: *Staphylococcus aureus* (в т.ч. штаммы, устойчивые к метициллину, стрептомицину, тетрациклину, эритромицину, неомицину, фузидовой кислоте, линкомицину, левомицетину), а также другие штаммы *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* (в т.ч. коагулаза-отрицательные); грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Moraxella catarrhalis*, *Bordetella pertussis*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter aerogenes*, *Citrobacter freundii*.

#### **Фармакокинетика**

Уровень системной абсорбции мупироцина с поверхности кожи и слизистых оболочек крайне низок. После абсорбции в системный кровоток мупироцин метаболизируется в неактивную мониевую кислоту и выводится почками.

### **Показания к применению:**

Для наружного применения: бактериальные инфекции кожи (в т.ч. импетиго, фолликулит, фурункулез); вторичные бактериальные инфекции (в т.ч. инфицированные экземы, язвы, небольшие раны и ожоги); профилактика инфекции при небольших ранах и хирургических разрезах.

Для интраназального применения: воспалительные заболевания полости носа (в т.ч. вызванные штаммами *Staphylococcus aureus*, полирезистентными и устойчивыми к метициллину).

**Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Фолликулит](#)
- [Фурункул](#)
- [Экзема](#)

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к мупироцину.

**Способ применения и дозы:**

Наружно применяют до 3 раз/сут в течение 10 дней. Интраназально - 2-3 раза/сут в течение 5-7 дней.

**Побочное действие:**

*Местные реакции:* при наружном применении возможны ощущение жжения, покалывания, зуд; при интраназальном применении возможен ринит.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять при беременности.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы показаниям к применению.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Supirocin>