

## Супракс Солютаб



### Код АТХ:

- [J01DD08](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цефиксим](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Таблетки диспергируемые** бледно-оранжевого цвета, продолговатые, с риской на обеих сторонах, с запахом клубники.

	<b>1 таб.</b>
цефиксима тригидрат	447.7 мг,
что соответствует содержанию цефиксима	400 мг

**Вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, гипролоза низкозамещенная, кремния диоксид коллоидный, повидон, магния стеарат, кальция сахарината трисесквигидрат, ароматизатор клубничный, краситель солнечный закат желтый (E110).

- 1 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 5 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 7 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:

- стрептококковый тонзиллит и фарингит;
- синуситы;
- острый бронхит;
- обострение хронического бронхита;
- острый средний отит;
- неосложненные инфекции мочевыводящих путей;
- неосложненная гонорея;
- шигеллез.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Гонорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфекции мочевыводящих путей](#)
- [Отит](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)
- [Шигеллез](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к цефалоспорином или пенициллинам;
- повышенная чувствительность к цефиксиму или компонентам препарата.

Не рекомендуется для применения у детей с хронической почечной недостаточностью и у детей с массой тела менее 25 кг в данной лекарственной форме.

С осторожностью следует назначать препарат при почечной недостаточности, колите (в анамнезе), при беременности, а также пациентам пожилого возраста.

## Способ применения и дозы:

Для **взрослых и детей с массой тела более 50 кг** суточная доза составляет 400 мг в 1 или 2 приема.

**Детям с массой тела 25-50 кг** препарат назначается в дозе 200 мг/сут в 1 прием.

Таблетку можно проглотить, запивая достаточным количеством воды, или развести в воде и выпить полученную суспензию сразу после приготовления. Препарат можно принимать независимо от приема пищи.

Продолжительность лечения зависит от характера течения заболевания и вида инфекции. После исчезновения симптомов инфекции и/или лихорадки целесообразно продолжать прием препарата в течение, как минимум, 48-72 ч.

Курс лечения при *инфекциях дыхательных путей и ЛОР-органов* составляет 7-14 дней.

При *тонзиллофарингите, вызванном Streptococcus pyogenes*, продолжительность лечения должна быть не менее 10 дней.

При *неосложненной гонорее* препарат назначают в дозе 400 мг однократно.

При *неосложненных инфекциях нижних отделов мочевыводящих путей у женщин* препарат назначают в течение 3-7 дней, при *неосложненных инфекциях верхних отделов мочевыводящих путей у женщин* - в течение 14 дней.

При *неосложненных инфекциях верхних и нижних отделов мочевыводящих путей у мужчин* продолжительность лечения составляет 7-14 дней.

При **нарушении функции почек** дозу устанавливают в зависимости от КК в сыворотке крови. При **КК 21-60 мл/мин** или у **пациентов, находящихся на гемодиализе**, рекомендуется использовать другие лекарственные формы препарата в связи с необходимостью уменьшения суточной дозы на 25%. При **КК 20 мл/мин и менее** или у **пациентов, находящихся на перитонеальном диализе**, суточную дозу следует уменьшить в 2 раза.

## Побочное действие:

Побочные эффекты классифицируются по частоте зарегистрированных случаев: очень часто (>10%); часто (1-10%); нечасто (0.1-1%); редко (0.01-0.1%); очень редко ( $\leq 0.01\%$ ).

*Со стороны системы кроветворения:* очень редко - транзиторная лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, тромбоцитопения или эозинофилия; в отдельных случаях - нарушения свертывания крови.

*Аллергические реакции:* редко - крапивница, кожный зуд; очень редко - синдром Лайелла (в данном случае препарат следует немедленно отменить), лекарственная лихорадка, синдром, напоминающий сывороточную болезнь, гемолитическая анемия и интерстициальный нефрит (при развитии анафилактического шока вводятся эпинефрин (адреналин), системные ГКС и антигистаминные препараты).

*Со стороны ЦНС:* нечасто - головные боли, головокружение, дисфория.

*Со стороны пищеварительной системы:* часто - боли в животе, нарушения пищеварения, тошнота, рвота и диарея; редко - транзиторное повышение уровня ЩФ и трансаминаз; очень редко - псевдомембранозный колит; в отдельных случаях - гепатит и холестатическая желтуха.

*Со стороны мочевыводящей системы:* очень редко - небольшое повышение концентрации креатинина в крови, гематурия.

## Передозировка:

При приеме в дозе, превышающей максимальную суточную, возможно увеличение частоты описанных выше дозозависимых побочных эффектов.

*Лечение:* промывание желудка; проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Гемодиализ и перитонеальный диализ не эффективны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Супракс Солютаб при беременности возможно в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует временно прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Блокаторы канальцевой секреции (в т.ч. пробенецид) замедляют выведение цефиксима с мочой, что может привести к симптомам передозировки.

Цефиксим снижает протромбиновый индекс, усиливает действие непрямых антикоагулянтов.

При одновременном применении цефиксима с карбамазепином наблюдалось увеличение концентрации последнего в плазме; в таких случаях целесообразно проведение терапевтического лекарственного мониторинга.

## Особые указания и меры предосторожности:

В связи с возможностью возникновения перекрестных аллергических реакций с пенициллинами, рекомендуется тщательно оценивать анамнез пациентов. При возникновении аллергической реакции применение препарата должно быть немедленно прекращено.

При длительном приеме препарата возможно нарушение нормальной микрофлоры кишечника, что может привести к избыточному размножению *Clostridium difficile* и развитию псевдомембранозного колита. При появлении легких форм антибиотик-ассоциированной диареи, как правило, достаточно прекратить прием препарата. При более тяжелых

## **Супракс Солютаб**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

формах рекомендуется корректирующее лечение (например, назначение ванкомицина внутрь по 250 мг 4 раза/сут). Противодиарейные препараты, ингибирующие моторику ЖКТ, при развитии псевдомембранозного колита противопоказаны.

В случае применения препарата Супракс Солютаб одновременно с аминогликозидами, полимиксином В, колистиметатом натрия, "петлевыми" диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота) в высоких дозах необходимо особенно тщательно контролировать функцию почек. После длительного лечения препаратом Супракс Солютаб следует проверять состояние функции гемопозза.

Диспергируемые таблетки следует растворять только в воде.

Во время лечения возможна ложноположительная прямая реакция Кумбса и ложноположительная реакция мочи на глюкозу при использовании некоторых тест-систем для экспресс-диагностики.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Исследований воздействия препарата Супракс Солютаб на способность управлять транспортными средствами и механизмами не проводилось. В связи с возможными неблагоприятными эффектами (например, головокружение), следует соблюдать осторожность.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Supraks\\_Solyutab](http://drugs.thead.ru/Supraks_Solyutab)