

Суприма-Бронхо



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** темно-коричневого цвета, с характерным ароматом.

	5 мл
экстракт адатоды васика	30 мг
экстракт солодки голой	20 мг
экстракт куркумы длинной	10 мг
экстракт базилика священного	10 мг
экстракт имбиря настоящего	10 мг
экстракт паслена желтоплодного	5 мг
экстракт перца длинного	5 мг
экстракт кардамона настоящего	5 мг

Вспомогательные вещества: ментол в сиропной основе со вкусом карамели (2.5 мг/5 мл).

100 мл - флаконы темного стекла, укупоренные навинчивающейся металлической крышкой с контролем первого вскрытия (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный фитопрепарат, обладающий бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Адатода васика оказывает муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Солодка голая оказывает анальгезирующее, успокаивающее, противовоспалительное, отхаркивающее действие.

Куркума длинная оказывает антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее действие.

Базилик священный оказывает отхаркивающее, жаропонижающее и антисептическое действие.

Имбирь настоящий оказывает противовоспалительное действие.

Паслен желтоплодный оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, жаропонижающее, противоаллергическое действие.

Кардамон настоящий оказывает вирусоостатическое и бронхолитическое действие.

Перец длинный оказывает антибактериальное и противоаллергическое действие.

Фармакокинетика

Действие препарата Суприма-Бронхо является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем:

- ОРВИ, грипп;
- фарингит, ларингит, трахеит;
- бронхит, пневмония;
- начальные стадии коклюша.

Хронические заболевания органов дыхания:

- бронхит курильщиков;
- лекторский ларингит.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Пневмония](#)
- [Трахеит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначают по 1-2 чайные ложки (5-10 мл) 3 раза/сут.

Детям от 6 до 14 лет - по 1/2-1 чайной ложке (2.5-5 мл) 3 раза/сут; **от 3 лет до 5 лет** - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут.

Курс лечения составляет 2-3 недели.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Суприма-Бронхо не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно только в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Суприма-Бронхо с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Одновременно по показаниям возможно применение противомикробных средств.

При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что Суприма-Бронхо в 5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержит 1.5 г сахара.

Применение в детском возрасте

Детям от 6 до 14 лет - по 1/2-1 чайной ложке (2.5-5 мл) 3 раза/сут; **от 3 лет до 5 лет** - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Suprima-Bronho>