

Суприма-ЛОР



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** (ананасовые) желтого цвета, круглые, с запахом ананаса; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат желтый, краситель хинолиновый желтый, отдушка ананасовая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (малиновые) красно-малинового цвета, круглые, с запахом малины; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, азорубин, отдушка малиновая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (ментоловые) светло-голубого цвета, круглые, с запахом ментола; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, бриллиантовый голубой, масло мяты.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом апельсина) оранжевого цвета, круглые, с запахом апельсина; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат FCF, отдушка апельсиновая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом клубники) красного цвета, круглые, с запахом клубники; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель Понсо 4R, отдушка клубничная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом лимона) желтого цвета, круглые, с запахом лимона; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат FCF, краситель хинолиновый желтый, отдушка лимонная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом меда и лимона) светло-желтого цвета, круглые, с запахом меда и лимона; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель хинолиновый желтый, отдушка медовая, отдушка лимонная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (с запахом эвкалипта) светло-голубого цвета, круглые, с запахом ментола и эвкалипта; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель бриллиантовый голубой FCF, отдушка эвкалиптовая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Суприма-ЛОР отсутствуют.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет.

При появлении первых симптомов воспаления в полости рта и глотки рекомендуется: **взрослым** - по 1 таб. каждые 2 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб. **Детям старше 6 лет** - по 1 таб. каждые 4 ч.

Таблетку следует рассасывать до полного растворения.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

При применения по показаниям в рекомендуемых дозах побочного действия препарата не отмечено.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Суприма-ЛОР с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать указанную дозу.

При назначении больным сахарным диабетом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахар.

Применение в детском возрасте

Рекомендуется детям старше 6 лет.

Условия хранения:

Суприма-ЛОР

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Suprima-LOR>