

## Суприма-ЛОР



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Таблетки для рассасывания** (ананасовые) желтого цвета, круглые, с запахом ананаса; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат желтый, краситель хинолиновый желтый, отдушка ананасовая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (малиновые) красно-малинового цвета, круглые, с запахом малины; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, азорубин, отдушка малиновая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (ментоловые) светло-голубого цвета, круглые, с запахом ментола; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза 84%, лимонная кислота безводная, ментол, бриллиантовый голубой, масло мяты.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом апельсина) оранжевого цвета, круглые, с запахом апельсина; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат FCF, отдушка апельсиновая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом клубники) красного цвета, круглые, с запахом клубники; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель Понсо 4R, отдушка клубничная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом лимона) желтого цвета, круглые, с запахом лимона; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель солнечный закат FCF, краситель хинолиновый желтый, отдушка лимонная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (с ароматом меда и лимона) светло-желтого цвета, круглые, с запахом меда и лимона; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель хинолиновый желтый, отдушка медовая, отдушка лимонная.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания** (с запахом эвкалипта) светло-голубого цвета, круглые, с запахом ментола и эвкалипта; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток; возможно появление белого налета.

	<b>1 таб.</b>
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахар S/30 основа, декстроза жидкая 84%, лимонная кислота безводная, ментол, краситель бриллиантовый голубой FCF, отдушка эвкалиптовая.

4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия.

### **Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Суприма-ЛОР отсутствуют.

### **Показания к применению:**

— симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

### **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет.

При появлении первых симптомов воспаления в полости рта и глотки рекомендуется: **взрослым** - по 1 таб. каждые 2 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб. **Детям старше 6 лет** - по 1 таб. каждые 4 ч.

Таблетку следует рассасывать до полного растворения.

### **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции.

При применения по показаниям в рекомендуемых дозах побочного действия препарата не отмечено.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Суприма-ЛОР с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не превышать указанную дозу.

При назначении больным сахарным диабетом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахар.

#### **Применение в детском возрасте**

Рекомендуется детям старше 6 лет.

### **Условия хранения:**

## **Суприма-ЛОР**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Suprima-Lor>