Суприма-Ноз



Код АТХ:

- R01AA07

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ксилометазолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные 0.05%*** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия фосфат однозамещенный, натрия хлорид, вода д/и.

10 мл - флаконы пластиковые с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы пластиковые с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

◊ ***Капли назальные 0.1%*** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия фосфат однозамещенный, натрия хлорид, вода д/и.

10 мл - флаконы пластиковые с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы пластиковые с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный 0.05%*** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия фосфат однозамещенный, натрия хлорид, вода д/и.

10 мл - флаконы пластиковые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы пластиковые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный 0.1%*** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия фосфат однозамещенный, натрия хлорид, вода д/и.

10 мл - флаконы пластиковые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы пластиковые с насадкой-распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат с альфа-адреномиметической активностью для местного применения в ЛОР-практике. Вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя отек и гиперемию, восстанавливает проходимость носовых ходов и облегчает дыхание.

Действие препарата наступает через несколько минут после его применения и продолжается до 10 ч.

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не всасывается, поэтому его концентрация в плазме крови столь мала, что не определяется современными аналитическими методами.

Показания к применению:

— ОРЗ с явлениями ринита (насморка);

— острый аллергический ринит;

— синусит;

— средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки);

— риноскопия.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Насморк
- Отит
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— тахикардия;

— выраженный атеросклероз;

— глаукома;

— атрофический ринит;

— гипертиреоз;

— хирургические вмешательства на оболочках мозга (в анамнезе);

— одновременное применение с ингибиторами МАО;

— одновременное применение с трициклическими антидепрессантами;

— беременность;

— детский возраст до 6 лет (для 0.1% раствора);

— детский возраст до 2 лет (для 0.05% раствора);

— повышенная чувствительность к ксилометазолину.

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов с сахарным диабетом, стенокардией III-IV функционального класса, гиперплазией предстательной железы, в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Не следует применять препарат без перерыва более 3-5 дней.

Капли назальные

Взрослым и **детям старше 6 лет** вводят по 2-3 кап. 0.1% раствора ксилометазолина в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Детям от 2 до 6 летназначают 0.05% раствора ксилометазолина по 1-2 кап. в каждый носовой ход 1-2 раза/сут. Не следует применять более 3 раз/сут.

Правила применения препарата

Колпачок отвинчивают, снимают и, немного нажимая на корпус флакона, закапывают раствор в нос.

Спрей назальный

Взрослым и **детям старше 6 лет** применяют по 1 впрыскиванию 0.1% раствора ксилометазолина из распылителя в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Детям от 2 до 6 летприменяют по 1 впрыскиванию 0.05% раствора ксилометазолина из распылителя в каждый носовой ход 1-2 раза/сут. Не следует применять более 3 раз/сут.

Правила применения препарата

Перед применением следует удалить защитный колпачок и несколько раз нажать на распылитель, пока струя не станет равномерной. При последующем применении распылитель-дозатор может быть использован без предварительной подготовки. Чтобы правильно осуществить впрыскивание, следует держать распылитель вертикально таким образом, чтобы насадка была направлена вверх. Затем следует поместить насадку в ноздрю, быстро и резко надавить 1 раз на распылитель и вынуть из ноздри. Во время впрыскивания следует вдохнуть немного воздуха через нос для оптимального распределения препарата.

Побочное действие:

Со стороны дыхательной системы: при частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция; редко - отек слизистой оболочки носа.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, повышение АД.

Со стороны ЦНС: головная боль, бессонница, депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

Прочие: рвота, нарушение зрения.

Передозировка:

Симптомы: усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое под наблюдением врача.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности.

Следует с осторожностью применять Суприма-Ноз в приод лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно усиление системного действия при одновременном применении с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Ксилометазолин в дозах, превышающих рекомендуемые, может оказывать влияние на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет (для 0.1% раствора); детский возраст до 2 лет (для 0.05% раствора).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Suprima-Noz