

Табекс



Код АТХ:

- [N07BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цитизин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: цитизин 1,5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат

Состав пленочной оболочки: опадрай II коричневый (гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид (E171), макрогол 3000, триацетин, краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172), краситель железа оксид черный (E172)).

Описание:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Н-холиномиметик. Возбуждает никотиновые рецепторы вегетативных ганглиев, рефлекторно стимулирует дыхательный центр, вызывает высвобождение адреналина хромафинными клетками медулярной части надпочечников, повышает АД.

Снижает никотиновую зависимость (связано с конкурентным взаимоотношением в области тех же рецепторов и биохимических субстратов, с которыми в организме взаимодействует никотин). Вызывает изменение вкуса курения (делая его неприятным), уменьшает стремление к курению и облегчает проявления абстинентного синдрома, связанного с прекращением курения.

Механизм действия цитизина близок к механизму действия никотина, что дает возможность постепенного отказа от курения и одновременно предотвращает развитие абстинентных явлений.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению:

Никотиновая зависимость у взрослых (для облегчения отказа от курения).

Относится к болезням:

- [Никотиновая зависимость](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- острый инфаркт миокарда;
- нестабильная стенокардия;
- аритмии;
- недавно перенесенное нарушение мозгового кровообращения;
- выраженный атеросклероз;
- кровотечение из крупных сосудов;
- артериальная гипертензия;
- отек легких;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (фаза обострения);
- бронхиальная астма;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью*. Назначают препарат при шизофрении, хромафинных опухолях надпочечников, гастроэзофагеальном рефлюксе, при ИБС (в т.ч. при хронической сердечной недостаточности), заболеваниях сосудов головного мозга, гипертиреозе, пептической язве желудка, сахарном диабете, при почечной и печеночной недостаточности. У детей в возрасте до 18 лет и пациентов старше 65 лет препарат следует применять после тщательной оценки соотношения предполагаемой пользы и потенциального риска.

Способ применения и дозы:

Табекс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат назначают в течение 3 дней по 1 таб. 6 раз/сут (через 2 ч) при параллельном сокращении количества выкуриваемых сигарет. При отсутствии эффекта препарат следует отменить и через 2-3 мес начать новый курс.

При положительном результате лечение продолжают по следующей схеме:

Период лечения	Кратность приема	Суточная доза
с 4 по 12 день	по 1 таб. каждые 2.5 ч	5 таб.
с 13 по 16 день	по 1 таб. каждые 3 ч	4 таб.
с 17 по 20 день	по 1 таб. каждые 5 ч	3 таб.
с 21 по 25 день	по 1 таб. каждые 6-8 ч	1-2 таб.

Курение следует прекратить не позднее 5 дня от начала лечения.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: изменение вкусовых ощущений и аппетита, сухость во рту, боли в животе, тошнота, запор, диарея.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, бессонница, сонливость, повышенная раздражительность.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, незначительное повышение АД, тахикардия, боли в грудной клетке, одышка.

Прочие: миалгии, снижение массы тела, повышенное потоотделение, аллергические реакции.

Большинство побочных явлений проходят самостоятельно.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, расширение зрачков, общая слабость, тахикардия, судороги, паралич дыхания.

Лечение: промывание желудка, контроль ЧСС, АД, функции дыхания; при необходимости - введение инфузионных растворов, противосудорожных препаратов, кардиотонических, analeptических и других симптоматических средств.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать Табекс при беременности из-за потенциального риска эмбриотоксического действия при неконтролируемом приеме.

Не рекомендуется принимать препарат в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует применять одновременно с противотуберкулезными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует применять только в том случае, если пациент имеет серьезное и осознанное намерение отказаться от курения.

Пациент должен быть предупрежден о том, что применение препарата на фоне продолжения курения может привести к никотиновой интоксикации.

Табекс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Прием препарата не вызывает изменений психофизического состояния пациента, не нарушает способности управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tabeks>