

Таденан



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** мягкие желатиновые, непрозрачные, размер №4, овальные, состоящие из двух продольных половинок белого/светло-зеленого цвета; содержимое капсул - маслянистая жидкость коричневого цвета.

	1 капс.
экстракт коры сливы африканской	50 мг

Вспомогательные вещества: масло арахисовое (150 мг).

Состав оболочки: желатин, глицерол, титана диоксид, медь-хлорофиллин натрия.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
30 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Уменьшает пролиферацию клеток предстательной железы. Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие. Действие определяется антипролиферативным влиянием на фибробласты, стимулированные b-FGF (основной фактор роста фибробластов). Устраняет и уменьшает функциональные расстройства мочеиспускания - дизурию, никтурию, поллакиурию при заболеваниях предстательной железы. Уменьшает воспалительную реакцию в тканях предстательной железы и способствует усилению ее секреторной активности; уменьшает количество резидуальной ткани после оперативного вмешательства.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Таденан не предоставлены.

Показания к применению:

— лечение умеренных функциональных нарушений мочевыводящей системы при доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы (частое мочеиспускание в дневное и ночное время, слабый напор струи, прерывистое мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, императивные позывы и мочеиспускания);

— состояние после аденомэктомии и простатэктомии.

Относится к болезням:

- [Простатит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 50 мг (1 капсуле) 2 раза/сут утром и вечером или 100 мг (2 капсулы) 1 раз/сут, предпочтительно перед едой. Суточная доза – 100 мг. Курс лечения в среднем составляет 6 недель и может быть увеличен до 8 недель. В случае необходимости возможно проведение повторного курса лечения.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко – запоры, тошнота, снижение аппетита, запор, диарея.

Со стороны половой системы: очень редко - гинекомастия, боль в тестикулах.

Аллергические реакции: редко - крапивница.

Передозировка:

В настоящее время данные по передозировке препарата Таденан отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Таденан не предназначен для женщин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Таденан отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

При доброкачественной гиперплазии предстательной железы необходимо регулярное наблюдение за состоянием предстательной железы, включая периодическое пальцевое ректальное исследование для исключения рака простаты.

Терапия Таденаном не заменяет хирургическое вмешательство, если оно необходимо.

В связи с тем, что препарат содержит арахисовое масло, существует риск реакций повышенной чувствительности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Таденан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tadenan>