Тадимакс

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричневого цвета, двояковыпуклые, овальной формы, с фаской; ядро коричневого цвета, на разрезе коричневого цвета с многочисленными мелкими желтыми вкраплениями.

	1 таб.
густой водный экстракт из смеси лекарственного растительного сырья (14.5:1):	
Кринума листьев	2 г
Анемарены корневищ	0.666 г
Бархата коры	0.666 г
Пустырника травы	0.666 г
Персика семян	0.083 г
Алисматиса корневищ	0.83 г
Пиона корней	0.5 г
Коричника коры	0.0083 г

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 0.055 г, крахмал 0.22 г, магния стеарат 0.0065 г, гипромеллоза 0.007 г, тальк 0.007 г, титана диоксид 0.001 г, макрогол 6000 0.0015 г, железа оксид красный (Е172) 0.0003 г, железа оксид черный (Е172) 0.0004 г.

21 шт. - блистеры алюминиевые (2) - пачки картонные.
21 шт. - блистеры алюминиевые (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим, умеренным ангиопротекторным действием.

Показания к применению:

— в комплексной терапии для устранения дизурических расстройств, при доброкачественной гиперплазия предстательной железы I и II стадии.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— тяжелые нарушения функции печени.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды. Препарат следует принимать по следующей схеме: 3 курса по 7 дней приема с перерывами между курсами по 7 дней. Продолжительность лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В 5 % случаях в начале применения препарата у пациентов возможно появление ощущения жжения в области заднего прохода. Это явление проходит в процессе приема препарата.

Передозировка:

Случаев передозировки препарата Тадимакс не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата у женщин не предусмотрено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при тяжелых нарушениях функции печени.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.