

Тактивин



Код АТХ:

- [L03AA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тимуса экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимуляторы](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее средство. При иммунодефицитных состояниях улучшает количественные и функциональные показатели Т-системы иммунитета: нормализует соотношение Т- и В-лимфоцитов.

Показания к применению:

— иммунодефицитные состояния у взрослых пациентов с преимущественным поражением Т-системы иммунитета на фоне инфекционных, гнойных и септических процессов, лимфопролиферативных заболеваний (лимфогранулематоз, лимфолейкоз).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Лимфогранулематоз](#)
- [Лимфогранулематоз](#)
- [Лимфома](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- atopическая бронхиальная астма;
- беременность.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят п/к 1 раз/сут (на ночь) в дозе 40 мкг/м² поверхности тела в течение 5-7 дней. При необходимости лечение можно повторить.

При стойких нарушениях иммунитета препарат вводят в тех же дозах в течение 5-6 дней, затем - 1 раз в 7-10 дней.

Для лечения хирургических больных препарат вводят в течение 2 дней до операции и в течение 3 дней - после нее.

При лимфопролиферативных заболеваниях препарат вводят до и, при необходимости, в перерывах между курсами противоопухолевой терапии.

Для лечения рецидивирующего офтальмогерпеса доза составляет 10 мкг/м²/сут, с интервалом в 1 день, в течение 14 сут. Курс лечения повторяют через 4-6 мес.

Для профилактики упорно рецидивирующего офтальмогерпеса в период, обычно предшествующий времени наступления рецидива, вводят каждые 3-6 мес по 25-50 мкг; курс лечения - 5 инъекций через день.

Побочное действие:

Провокация гипериммунного цитолиза. Обострение гнойных инфекций.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Taktivin>