

Тальцид



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки жевательные** белого цвета, круглые, плоские, скошенные к краю, с оттиском в виде фирменного знака ("байеровский" крест) с одной стороны и "TALCID" - с другой.

	1 таб.
гидроталцит	500 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, крахмал кукурузный, магния стеарат, натрия сахаринат, ароматизатор мятный, ароматизатор банановый.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат. Имеет кристаллическую слоисто-сетчатую структуру с низким содержанием алюминия и магния. Тальцид обеспечивает быструю и продолжительную нейтрализацию соляной кислоты желудочного сока без чрезмерного защелачивания желудочного содержимого с поддержанием pH на оптимальном терапевтическом уровне между 3 и 5 в течение 75-90 мин; оказывает гастропротекторное действие за счет длительного связывания пепсина, соляной кислоты, желчных кислот; также активизирует собственные факторы защиты желудка.

Фармакокинетика

Благодаря слоисто-сетчатой структуре Тальцида, высвобождение ионов алюминия и магния происходит в желудке постепенно в зависимости от уровня pH. 1 г гидроталцита обладает буферной емкостью 27.8 мэкв. После приема Тальцида уровень алюминия и магния в плазме крови при нормальной функции почек остается в пределах физиологической нормы, проникновение ионов алюминия и магния в нервную и костные ткани не наблюдается.

Показания к применению:

—острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. гастрит, дуоденит);

—язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

—нарушения функции ЖКТ, связанные с неправильным питанием или приемом препаратов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку желудка;

—рефлюкс-эзофагит;

—изжога, отрыжка, чувство переполнения в желудке.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Отрыжка](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

—индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут (через 1-2 ч после приема пищи и перед сном). Таблетки следует разжевывать и запить водой. Длительность приема при *язвенной болезни* составляет в среднем 4 недели.

Разовая доза для **детей** составляет 1/2-1 таб.

Побочное действие:

Возможно: частый стул (диарея).

При приеме Тальцида нежелательные побочные эффекты наблюдаются редко и связаны в основном с длительным приемом препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тальцид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время не сообщалось о случаях возникновения нежелательных эффектов при применении Тальцида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

В *экспериментальных исследованиях* не выявлено тератогенного действия Тальцида.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Тальцид снижает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда, фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин).

Особые указания и меры предосторожности:

1 таб. Тальцида содержит 0.0086 XE и незначительное количество натрия сахарината, что дает возможность назначать препарат пациентам с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Не рекомендуется применять препарат пациентам с нарушением выделительной функций почек.

Тальцид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не рекомендуют принимать Тальцид одновременно с напитками, содержащими кислоту (соки, вино).

Тальцид следует принимать за 1-2 ч до или после приема препаратов, содержащих железо, производных хенодезоксихолевой кислоты, дигоксина, циметидина, производных кумарина.

При нарушениях функции почек

Не рекомендуется применять препарат пациентам с нарушением выделительной функцией почек.

Применение в детском возрасте

Разовая доза для **детей** составляет 1/2-1 таб.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном месте.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

5 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Talcid>