Тамерит

Код АТХ:

- L03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аминодигидрофталазиндион натрия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

5-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-диона натриевая соль.

Иммуностимулирующее средство, оказывает также противовоспалительное действие. Подавляет (обратимо, на 6-8 ч) гиперактивность макрофагов, снижает избыточный синтез ФНО, интерлейкина1, продукцию активных форм кислорода и других острофазных белков, ответственных за развитие токсического и диарейного синдрома. Нормализует функциональное состояние макрофагов, приводит к восстановлению их антиген-представляющей и регулирующей функции. Увеличивая функциональную антибактериальную активность нейтрофильных гранулоцитов, усиливает фагоцитоз и повышает неспецифическую защиту организма.

Фармакокинетика

Выводится преимущественно почками. $T_{1/2}$ - 15-30 мин.

Показания к применению:

— острые и хронические воспалительные заболевания ЖКТ, сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей.

Суппозитории ректальные (дополнительно):

— хронический рецидивирующий фурункулез;

— хроническая рецидивирующая герпесвирусная инфекция;

— послеоперационные гнойно-септические осложенения - в составе комплексной терапии.

Относится к болезням:

- Герпес
- Диарея
- Интоксикация
- Инфекции
- Фурункул

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

В/м, ректально, в остром периоде заболевания начальная доза - 0.2 г, затем по 0.1 г 2-3 раза/сут (через каждые 4-6 ч); при *хронических заболеваниях* - по 0.1 г 2 раза/сут (через 6-8 ч) до исчезновения симптомов интоксикации и/или диареи. Курс лечения - до 10 дней.

Хроническая рецидивирующая герпесвирусная инфекция - ректально, по 0.1 г ежедневно в течение 20 дней, *послеоперационные гнойно-септические осложнения* - по 0.1 г через день, курс - 15-20 суппозиториев.

Перед введением порошок разводят во флаконе 2-3 мл воды д/и или 0.9% раствором NaCl с соблюдением требований асептики.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tamerit