

[Тамерит](#)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аминодигидрофалазиндион натрия](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимулирующие средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

5-амино-1,2,3,4-тетрагидрофалазин-1,4-диона натриевая соль.

Иммуностимулирующее средство, оказывает также противовоспалительное действие. Подавляет (обратимо, на 6-8 ч) гиперактивность макрофагов, снижает избыточный синтез ФНО, интерлейкина1, продукцию активных форм кислорода и других острофазных белков, ответственных за развитие токсического и диарейного синдрома. Нормализует функциональное состояние макрофагов, приводит к восстановлению их антиген-представляющей и регулирующей функции. Увеличивая функциональную антибактериальную активность нейтрофильных гранулоцитов, усиливает фагоцитоз и повышает неспецифическую защиту организма.

Фармакокинетика

Выводится преимущественно почками. $T_{1/2}$ - 15-30 мин.

Показания к применению:

— острые и хронические воспалительные заболевания ЖКТ, сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей.

Суппозитории ректальные (дополнительно):

- хронический рецидивирующий фурункулез;
- хроническая рецидивирующая герпесвирусная инфекция;

— послеоперационные гнойно-септические осложнения - в составе комплексной терапии.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Диарея](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Фурункул](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

В/м, ректально, в остром периоде заболевания начальная доза - 0.2 г, затем по 0.1 г 2-3 раза/сут (через каждые 4-6 ч); при *хронических заболеваниях* - по 0.1 г 2 раза/сут (через 6-8 ч) до исчезновения симптомов интоксикации и/или диареи. Курс лечения - до 10 дней.

Хроническая рецидивирующая герпесвирусная инфекция - ректально, по 0.1 г ежедневно в течение 20 дней, *послеоперационные гнойно-септические осложнения* - по 0.1 г через день, курс - 15-20 суппозиторияев.

Перед введением порошок разводят во флаконе 2-3 мл воды д/и или 0.9% раствором NaCl с соблюдением требований асептики.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tamerit>