

## Танацехол



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пижмы обыкновенной цветков экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** светло-желтого цвета, двояковыпуклые, на поперечном разрезе видны два слоя.

|           |               |
|-----------|---------------|
|           | <b>1 таб.</b> |
| танацехол | 50 мг         |

*Вспомогательные вещества:* лактоза, крахмал картофельный, аэросил, кальция стеарат.

*Состав оболочки:* сахар, магния гидроксикарбонат, кремния диоксид, желатин, титана диоксид, поливинилпирролидон, воск пчелиный, тропеолин-О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Желчегонный препарат растительного происхождения. Танацехол получают из цветков пижмы *Tanacetum Vulgare L.* семейства астровых *Asteraceae*. Усиливает образование и выделение желчи, способствует изменению ее биохимического состава. Оказывает спазмолитическое действие на желчный пузырь, желчные протоки и кишечник.

### Показания к применению:

## Танацехол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Взрослым в качестве желчегонного и спазмолитического средства:

- при хронических некалькулезных холециститах;
- при дискинезиях желчевыводящих путей по гипермоторному типу;
- при постхолецистэктомическом синдроме.

### Относится к болезням:

- [Спазмы](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

### Противопоказания:

- желчнокаменная болезнь;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут. Курс лечения - 20-30 дней.

Таблетки следует принимать за 15-20 мин до еды.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

### Передозировка:

*Симптомы:* возможно усиление побочных эффектов препарата.

*Лечение:* отмена препарата, проведение симптоматической терапии.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводилось.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно назначение в сочетании с препаратами, применяемыми в гастроэнтерологии (в т.ч. ферменты, антацидные препараты).

### Особые указания и меры предосторожности:

По данным клинических исследований Танацехол эффективно купирует симптомы, связанные с нарушением двигательной функции кишечника и желчных путей, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, протекающего с преобладанием запоров, в сочетании с дисфункцией желчного пузыря и протоков.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Tanacehol>