Танацехол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пижмы обыкновенной цветков экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** светло-желтого цвета, двояковыпуклые, на поперечном разрезе видны два слоя.

	1 таб.
танацехол	50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, аэросил, кальция стеарат.

Состав оболочки: сахар, магния гидроксикарбонат, кремния диоксид, желатин, титана диоксид, поливинилпирролидон, воск пчелиный, тропеолин-О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Желчегонный препарат растительного происхождения. Танацехол получают из цветков пижмы Tanacetum Vulgare L. семейства астровых Asteraceae. Усиливает образование и выделение желчи, способствует изменению ее биохимического состава. Оказывает спазмолитическое действие на желчный пузырь, желчные протоки и кишечник.

Показания к применению:

Взрослым в качестве желчегонного и спазмолитического средства:

— при хронических некалькулезных холециститах;

— при дискинезиях желчевыводящих путей по гипермоторному типу;

— при постхолецистэктомическом синдроме.

Относится к болезням:

- Спазмы
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— желчнокаменная болезнь;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут. Курс лечения - 20-30 дней.

Таблетки следует принимать за 15-20 мин до еды.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов препарата.

Лечение: отмена препарата, проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно назначение в сочетании с препаратами, применяемыми в гастроэнтерологии (в т.ч. ферменты, антацидные препараты).

Особые указания и меры предосторожности:

По данным клинических исследований Танацехол эффективно купирует симптомы, связанные с нарушением двигательной функции кишечника и желчных путей, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, протекающего с преобладанием запоров, в сочетании с дисфункцией желчного пузыря и протоков.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tanacehol