Тантум Роза



Код АТХ:

- G02CC03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензидамин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления вагинального раствора*** в виде однородных гранул белого цвета, без комков и инородных частиц.

	1 саше
бензидамина гидрохлорид	500 мг

Вспомогательные вещества: триметилцетиламмония-пара-толуенсульфонат, повидон, натрия хлорид.

9.44 г - саше из бумаги и полипропилена (10) - пачки картонные.

◊ ***Раствор вагинальный 0.1%*** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом роз.

	1 мл
бензидамина гидрохлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: триметилцетиламмония-пара-толуенсульфонат, этанол 96%, полисорбат 20, масло розовое, вода очищенная.

140 мл - флаконы полиэтиленовые с крышкой с канюлей и направляющей насадкой (5) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС для местного применения, относится к группе индазолов. Бензидамин обладает антибактериальным, противовоспалительным, антиэкссудативным и анальгезирующим действием, а также гистопротекторной активностью.

Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

Бензидамин оказывает антибактериальное действие за счет быстрого проникновения через мембраны микроорганизмов с последующим повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов и лизисом клетки.

Обладает противогрибковым действием в отношении Candida albicans. Вызывает структурные модификации клеточной стенки грибов и метаболических цепей мицетов и таким образом препятствует их репродукции.

Фармакокинетика

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Бензидамин выводится в основном почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Бензидамин в лекарственных формах для местного применения не обладает системным действием и не проникает в грудное молоко.

Показания к применению:

— бактериальный вагиноз;

— специфические вульвовагиниты (в составе комплексной терапии);

— неспецифические вульвовагиниты и цервиковагиниты любой этиологии, включая вторично развившиеся на фоне химиотерапии и радиотерапии;

— профилактика пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии;

— в качестве гигиенического средства в послеродовом периоде.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют интравагинально.

Порошок для приготовления раствора вагинального: содержимое 1 пакетика с порошком перед применением растворяют в 500 мл воды.

Раствор вагинальный 0.1%: для 1 спринцевания используют весь объем флакона (140 мл). Перед введением раствор следует немного подогреть на водяной бане. Процедуру следует проводить лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут.

При *бактериальном вагинозе* вагинальные орошения проводят 1-2 раза/сут в течение 7-10 дней.

При *неспецифических вульвовагинитах и цервиковагинитах любой этиологии, включая вторично развившиеся на*

фоне химиотерапии и радиотерапии, при специфических вульвовагинитах (в составе комплексной терапии) препарат применяют 2 раза/сут в течение 10 дней.

Для *профилактики пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии и в качестве гигиенического средства в послеродовом периоде* препарат применяют 1 раз/сут в течение 3-5 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям и в рекомендуемых дозах побочные эффекты не наблюдаются.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум роза не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания к местному применению препарата Тантум роза при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат в течение длительного времени, т.к. это может вызвать развитие реакций повышенной чувствительности. Если в течение рекомендуемого курса лечения терапевтический эффект отсутствует, то пациентка должна обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность к управлению автотранспортом и к другим потенциально опасным видам деятельности, требующим повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Протиовпоказание: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tantum_Roza