

Тантум Роза



Код АТХ:

- [G02CC03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензидамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLS VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления вагинального раствора** в виде однородных гранул белого цвета, без комков и инородных частиц.

	1 саше
бензидамина гидрохлорид	500 мг

Вспомогательные вещества: триметилцетиламмония-пара-толуенсульфонат, повидон, натрия хлорид.

9.44 г - саше из бумаги и полипропилена (10) - пачки картонные.

◇ **Раствор вагинальный 0.1%** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом роз.

	1 мл
бензидамина гидрохлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: триметилцетиламмония-пара-толуенсульфонат, этанол 96%, полисорбат 20, масло розовое, вода очищенная.

140 мл - флаконы полиэтиленовые с крышкой с канюлей и направляющей насадкой (5) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС для местного применения, относится к группе индазолов. Бензидамин обладает антибактериальным, противовоспалительным, антиэкссудативным и анальгезирующим действием, а также гистопротекторной активностью.

Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

Бензидамин оказывает антибактериальное действие за счет быстрого проникновения через мембраны микроорганизмов с последующим повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов и лизисом клетки.

Обладает противогрибковым действием в отношении *Candida albicans*. Вызывает структурные модификации клеточной стенки грибов и метаболических цепей мицетов и таким образом препятствует их репродукции.

Фармакокинетика

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Бензидамин выводится в основном почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Бензидамин в лекарственных формах для местного применения не обладает системным действием и не проникает в грудное молоко.

Показания к применению:

- бактериальный вагиноз;
- специфические вульвовагиниты (в составе комплексной терапии);
- неспецифические вульвовагиниты и цервикалиты любой этиологии, включая вторично развившиеся на фоне химиотерапии и радиотерапии;
- профилактика пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии;
- в качестве гигиенического средства в послеродовом периоде.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют интравагинально.

Порошок для приготовления раствора вагинального: содержимое 1 пакетика с порошком перед применением растворяют в 500 мл воды.

Раствор вагинальный 0.1%: для 1 спринцевания используют весь объем флакона (140 мл). Перед введением раствор следует немного подогреть на водяной бане. Процедуру следует проводить лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут.

При *бактериальном вагинозе* вагинальные орошения проводят 1-2 раза/сут в течение 7-10 дней.

При *неспецифических вульвовагинитах и цервикалиты любой этиологии, включая вторично развившиеся на*

Тантум Роза

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

фоне химиотерапии и радиотерапии, при специфических вульвовагинитах (в составе комплексной терапии) препарат применяют 2 раза/сут в течение 10 дней.

Для профилактики пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии и в качестве гигиенического средства в послеродовом периоде препарат применяют 1 раз/сут в течение 3-5 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям и в рекомендуемых дозах побочные эффекты не наблюдаются.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум роза не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания к местному применению препарата Тантум роза при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат в течение длительного времени, т.к. это может вызвать развитие реакций повышенной чувствительности. Если в течение рекомендуемого курса лечения терапевтический эффект отсутствует, то пациентка должна обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность к управлению автотранспортом и к другим потенциально опасным видам деятельности, требующим повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tantum_Roza