

Тантум Верде



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензидамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** зеленого цвета, полупрозрачные, квадратные, с углублением в центре, с характерным мятно-лимонным запахом.

	1 таб.
бензидамина гидрохлорид	3 мг

Вспомогательные вещества: изомальтоза, рацементол, аспартам, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор мятный, ароматизатор лимонный, краситель хинолиновый желтый (E104), краситель индигокармин (E132).

1 шт. - обертки из парафинированной бумаги (10) - обертки из двухслойной алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом, принадлежит к группе индазолов. Оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, обладает антисептическим действием против широкого спектра микроорганизмов.

Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

Бензидамин оказывает антибактериальное и специфическое антимикробное действие за счет быстрого проникновения через мембраны микроорганизмов с последующим повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов и лизисом клетки.

Обладает противогрибковым действием в отношении *Candida albicans*. Вызывает структурные модификации клеточной стенки грибов и метаболических цепей мицетов, таким образом препятствует их репродукции, что явилось основанием для применения бензидамина при воспалительных процессах в ротовой полости, включая инфекционную этиологию.

Фармакокинетика

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Экскреция препарата происходит в основном почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Лекарственные формы для местного применения не обладают системным действием и не проникают в грудное молоко.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии):

- гингивит, глоссит, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии);
- ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;
- кандидоз слизистой оболочки полости рта (в составе комбинированной терапии);
- калькулезное воспаление слюнных желез;
- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти);
- после лечения или удаления зубов;
- пародонтоз.

При инфекционных и воспалительных заболеваниях, требующих системного лечения, необходимо применение Тантум Верде в составе комбинированной терапии.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Воспаление](#)
- [Инфекции](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата;
- детский возраст до 3 лет;
- детский возраст до 12 лет (для применения раствора 0.15%);
- фенилкетонурия (для применения таблеток).

Способ применения и дозы:

Таблетки для рассасывания 3 мг: взрослым, больным пожилого возраста и детям с 3 лет, назначают по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Таблетку держать во рту до полного рассасывания (для большего эффекта желательно максимально долго).

Раствор для местного применения 0.15%: взрослым, больным пожилого возраста и детям с 12 лет назначают для полоскания горла или полости рта, используют по 15 мл препарата (мерный стаканчик прилагается) 2-3 раза в день.

- неразведенный раствор используется для полоскания при воспалительных процессах;

- разведенный раствор (15 мл препарата и 15 мл воды смешать в мерном стаканчике) использовать ежедневно для гигиенических полосканий рта и горла.

Спрей для местного применения дозированный 0.255 мг/доза: взрослым и больным пожилого возраста назначают по 4-8 доз каждые 1.5-3 ч;

- детям в возрасте 3-6 лет - по 1-4 дозы (максимально - 4 дозы) каждые 1.5-3 ч;

- детям в возрасте 6-12 лет— по 4 дозы каждые 1.5-3 ч.

Курс лечения:

- при воспалительных заболеваниях полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии): от 4 до 15 дней;

- при одонто-стоматологической патологии: от 6 до 25 дней;

- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти) при применении спрея и раствора: от 4 до 7 дней.

При применении препарата в течение длительных сроков, необходима консультация врача.

Побочное действие:

Местные реакции: сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости.

Аллергические реакции: кожная сыпь.

Очень редко: ларингоспазм.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум Верде не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно использование препарата во время беременности и лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Тантум Верде с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Если при применении раствора возникает ощущение жжения, раствор следует предварительно разбавить водой в два раза, путем доведения уровня воды до риски в градуированном стаканчике.

Следует избегать попадания спрея в глаза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и иную деятельность требующую повышенного внимания.

Применение в пожилом возрасте

Назначают по показаниям

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 3 лет. Раствор 0.15% противопоказан детям в возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Таблетки для рассасывания - при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте. Раствор для местного применения - при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте. Спрей для местного применения дозированный - при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Таблетки для рассасывания - 4 года. Раствор для местного применения - 4 года. Спрей для местного применения дозированный 0.255 мг/доза - 4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tantum_Verde