Тантум Верде (раствор)



Код АТХ:

- A01AD02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензидамин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей для местного применения дозированный*** в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным запахом мяты.

	1 доза	**100 мл**
бензидамина гидрохлорид	255 мкг	150 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый, сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.

30 мл (176 доз) - флаконы полиэтиленовые с помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей (1) - пачки картонные.

◊ ***Раствор для местного применения 0.15%*** прозрачный, зеленого цвета, с характерным запахом мяты.

	100 мл
бензидамина гидрохлорид	150 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый, сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, краситель хинолиновый желтый 70% (E104), краситель синий патентованный 85% (E131), вода очищенная.

120 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с градуированным полипропиленовым стаканчиком (на 15 и 30 мл) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС из группы индозолов для местного применения в ЛОР-практике и в стоматологии. Оказывает противовоспалительное и местное анальгезирующее действие. Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Фармакокинетика

Бензидамин выводится почками и через кишечник.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов:

— гингивит, глоссит, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии);

— ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;

— кандидоз (в составе комбинированной терапии);

— калькулезное воспаление слюнных желез;

— после оперативных вмешательств и травм (в т.ч. тонзиллэктомия, переломы челюсти);

— после лечения или удаления зубов;

— пародонтоз.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях необходимо применение Тантум Верде в составе комбинированной терапии.

Относится к болезням:

- Ангина
- Воспаление
- Инфекции
- Ларингит
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Травмы
- Фарингит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет (для раствора для местного применения);

— фенилкетонурия (для таблеток);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки для рассасывания назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут.

Раствор для местного применения применяют по 1 столовой ложке (15 мл) препарата для полоскания рта или горла каждые 1.5-3 ч для облегчения боли. После полоскания раствор необходимо выплюнуть.

Взрослым (в т.ч. лицам пожилого возраста) назначают по 4-8 доз спрея каждые 1.5-3 ч. **Детям в возрасте 6-12 лет** - по 4 дозы; **детям младше 6 лет** дозу устанавливают из расчета по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1.5-3 ч.

Побочное действие:

Местные реакции: сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости.

Аллергические реакции: кожная сыпь.

Прочие: сонливость.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум Верде не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Тантум Верде не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания спрея в глаза.

Если при применении раствора возникает ощущение жжения, то раствор следует разбавить водой в 2 раза путем доведения уровня воды до риски в градуированном стаканчике.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет (для раствора для местного применения).

Детям в возрасте 6-12 лет - по 4 дозы; **детям младше 6 лет** дозу устанавливают из расчета по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1.5-3 ч.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tantum_Verde_rastvor