

## Тантум Верде (раствор)



### Код АТХ:

- [A01AD02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензидамин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей для местного применения дозированный** в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным запахом мяты.

	<b>1 доза</b>	<b>100 мл</b>
бензидамина гидрохлорид	255 мкг	150 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксibenзоат, ароматизатор ментоловый, сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.

30 мл (176 доз) - флаконы полиэтиленовые с помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей (1) - пачки картонные.

◇ **Раствор для местного применения 0.15%** прозрачный, зеленого цвета, с характерным запахом мяты.

	<b>100 мл</b>
бензидамина гидрохлорид	150 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксibenзоат, ароматизатор ментоловый, сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, краситель хинолиновый желтый 70% (E104), краситель синий патентованный 85% (E131), вода очищенная.

120 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с градуированным полипропиленовым стаканчиком (на 15 и 30 мл) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

НПВС из группы индололов для местного применения в ЛОР-практике и в стоматологии. Оказывает противовоспалительное и местное анальгезирующее действие. Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

### Фармакокинетика

Бензидамин выводится почками и через кишечник.

## Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов:

- гингивит, глоссит, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии);
- ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;
- кандидоз (в составе комбинированной терапии);
- калькулезное воспаление слюнных желез;
- после оперативных вмешательств и травм (в т.ч. тонзиллэктомия, переломы челюсти);
- после лечения или удаления зубов;
- пародонтоз.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях необходимо применение Тантум Верде в составе комбинированной терапии.

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Воспаление](#)
- [Инфекции](#)
- [Ларингит](#)
- [Пародонит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Фарингит](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет (для раствора для местного применения);
- фенилкетонурия (для таблеток);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Таблетки для рассасывания назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут.

## Тантум Верде (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Раствор для местного применения применяют по 1 столовой ложке (15 мл) препарата для полоскания рта или горла каждые 1.5-3 ч для облегчения боли. После полоскания раствор необходимо выплюнуть.

**Взрослым** (в т.ч. лицам пожилого возраста) назначают по 4-8 доз спрея каждые 1.5-3 ч. **Детям в возрасте 6-12 лет** - по 4 дозы; **детям младше 6 лет** дозу устанавливают из расчета по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1.5-3 ч.

### Побочное действие:

*Местные реакции:* сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь.

*Прочие:* сонливость.

### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум Верде не сообщалось.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Тантум Верде не установлено.

### Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания спрея в глаза.

Если при применении раствора возникает ощущение жжения, то раствор следует разбавить водой в 2 раза путем доведения уровня воды до риски в градуированном стаканчике.

#### *Применение в детском возрасте*

Препарат противопоказан детям до 12 лет (для раствора для местного применения).

**Детям в возрасте 6-12 лет** - по 4 дозы; **детям младше 6 лет** дозу устанавливают из расчета по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1.5-3 ч.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### Срок годности:

4 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Tantum\\_Verde\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Tantum_Verde_rastvor)