Таурин-Акос



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные 4% бесцветные, прозрачные.

	1 мл
таурин	40 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин, метилпарабен), вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противокатарактное средство, оказывает метаболическое действие.

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления ионов калия и кальция, улучшения условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению:

- дистрофия роговицы;
- старческие, диабетические, травматические и лучевые катаракты;
- травмы роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).

Относится к болезням:

- Катаракта
- Травмы

Противопоказания:

- детский возраст (до 18 лет);
- повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

При *катарактах* назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза/сут в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только после соотношения риск/пользы (эффективность и безопасность не установлены).

Особые указания и меры предосторожности:

Эффективность и безопасность применения препарата у пациентов моложе 18 лет не установлена.

Применение в детском возрасте

Эффективность и безопасность применения препарата у пациентов моложе 18 лет не установлена.

Условия хранения:

Список Б. хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от 8° до 15°C.

После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Taurin-Akos