Тедеин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывающий противокашлевое и отхаркивающее действие.

Кодеин обладает центральным противокашлевым эффектом, уменьшая возбудимость кашлевого центра.

Терпингидрат усиливает секрецию бронхиальных желез, способствует эвакуации слизи из дыхательных путей, ослабляет кашлевой рефлекс.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся сухим кашлем.

Относится к болезням:

- Бронхит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— бронхиальная астма;

— дыхательная недостаточность;

— одновременный прием анальгетиков центрального действия (бупренорфин, налбуфин, пентазоцин), муколитических и отхаркивающих лекарственных средств, этанола;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 5 лет).

С *осторожностью:* внутричерепная гипертензия.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** и **детям старше 12 лет** - по 1 таб. 2-3 раза/сут. **Детям 5-12 лет** - 1 таб. 2 раза/сут.

Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - не более 5 суток.

Побочное действие:

Аллергические реакции (кожный зуд, крапивница), головная боль, сонливость, тошнота, рвота, запор. Лекарственная зависимость (при длительном приеме).

Передозировка:

Симптомы: угнетение дыхания, брадикардия, миоз, тошнота, рвота, зуд, атония мочевого пузыря, запор.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия (в т.ч. восстановление дыхания и сердечно-сосудистой деятельности), введение дыхательных аналептиков, атропина, налоксона (антагонист кодеина).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Прием препарата противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственные средства, угнетающие ЦНС (снотворные, седативные, антигистаминные средства, анальгетики центрального действия, анксиолитики, антипсихотические лекарственные средства) - риск усиления седативного эффекта и угнетающего действия на дыхательный центр.

Хлорамфеникол угнетает метаболизм кодеина, усиливая его действие.

Применение кодеина в больших дозах усиливает действие сердечных гликозидов (например, дигоксина) за счет ослабления перистальтики ЖКТ и усиления их всасывания.

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные средства уменьшают всасывание кодеина в ЖКТ.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушении функции почек выведение кодеина замедляется, поэтому рекомендуется удлинять интервалы между приемами препарата.

Следует помнить, что препарат содержит кодеин, что может повлиять на результаты допинг-теста.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

При нарушении функции почек выведение кодеина замедляется, поэтому рекомендуется удлинять интервалы между приемами препарата.

Применение в детском возрасте

Прием препарата противопоказан детям в возрасте до 5 лет.

Перед назначением детям старше 5 лет следует внимательно изучить инструкцию по применению.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tedein