

Тэнфлекс



Код АТХ:

- [A01AD02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензидамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Механизм действия связан с ингибированием фермента ЦОГ и нарушением синтеза простагландинов.

Показания к применению:

Для приема внутрь: болевой синдром малой и умеренной интенсивности различной этиологии.

Для наружного применения: венозная недостаточность нижних конечностей с проявлениями флебостаза, флебиты и тромбофлебиты поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии), состояния после склерозирования вен и флебэктомии, постфлебитические синдромы, нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях при беременности.

Для местного применения: воспалительные заболевания полости рта и горла, в качестве дополнительного средства при консервативной терапии после экстракции зуба, после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти), калькулезное воспаление слюнных желез, воспалительные заболевания влагиалища.

Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Венозная недостаточность](#)

- [Воспаление](#)
- [Склерит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Флебит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бензидамину.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь - по 50 мг 4 раза/сут. Наружно и местно применяется 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: сонливость, аллергические реакции.

Местные реакции: чувство жжения, онемение тканей.

При местном применении возможны реакции, связанные с резорбтивным действием.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применять при беременности и в период лактации, прием внутрь у этой категории пациентов не рекомендуется.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях применяют в составе комбинированной терапии.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tenfleks>