

## [Тэнфлекс \(спрей\)](#)



### **Код АТХ:**

- [A01AD02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бензидамин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

НПВС. Механизм действия связан с ингибированием фермента ЦОГ и нарушением синтеза простагландинов.

### **Показания к применению:**

Для приема внутрь: болевой синдром малой и умеренной интенсивности различной этиологии.

Для наружного применения: венозная недостаточность нижних конечностей с проявлениями флебостаза, флебиты и тромбофлебиты поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии), состояния после склерозирования вен и флебэктомии, постфлебитические синдромы, нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях при беременности.

Для местного применения: воспалительные заболевания полости рта и горла, в качестве дополнительного средства при консервативной терапии после экстракции зуба, после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти), калькулезное воспаление слюнных желез, воспалительные заболевания влагиалища.

### **Относится к болезням:**

- [Болевой синдром](#)
- [Венозная недостаточность](#)

- [Воспаление](#)
- [Склерит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Флебит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к бензидамину.

### **Способ применения и дозы:**

Для приема внутрь - по 50 мг 4 раза/сут. Наружно и местно применяется 1-2 раза/сут.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* сонливость, аллергические реакции.

*Местные реакции:* чувство жжения, онемение тканей.

При местном применении возможны реакции, связанные с резорбтивным действием.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью применять при беременности и в период лактации, прием внутрь у этой категории пациентов не рекомендуется.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях применяют в составе комбинированной терапии.

#### ***Применение в детском возрасте***

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Tenfleks\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Tenfleks_sprey)